

一壓，並將果實向相反方向一動就可剝離。將剝離的果梗，用剪刀修平，以防擦傷。為了避免在輸送中擦傷，部分菜農常用剪刀採收，這樣不但效率差，而且會傳播毒素病，所以應改為用手採收，然後再修剪果梗。



採收工作，應在朝露已乾（即上午九時至十一時之間），果實溫度未上昇以前舉行。如在下午採收，因果實溫度已經昇高，容易在輸送中因過度成熟而引起腐爛。

包裝時，不須加入谷殼等填充物，因為谷殼易使溫度提高，不但會引起過度的成熟，果實顏色也較差（因為溫度過高時，黃色色素比紅色色素形成得多）。

如能注意以上的幾項，本省的番茄，必可獲得市場的信用。



皮表時皮抓甲指用
。離剝皮果外由易

尚，色綠呈面下蒂果
。環圓色褐出顯未



定鑑的期前熟綠：二圖

現呈，心中爲痕花以
。斑條色白的明顯



果蒂下面呈現
褐色的圓環。

期適收採的茄番銷外：三圖

驅除乳牛吸血蠅，環境衛生最重要！

要驅除乳牛蠅虻等吸血性昆蟲，以環境衛生最爲重要，也就是說，應該注意日常的環境衛生，消滅幼蟲；至於牛身上成蟲的驅除，只能算是消極的方法。

牛蠅蠅蟲在畜糞、草或垃圾箱等處產卵，經半天至一天即孵化成幼蟲。幼蟲在原處攝食大量有機物質，約一星期後，必須移到附近土壤中變成蛹。蛹經二至五日後羽化成成蟲。

所以，經常清掃畜舍內外，將畜糞、草及垃圾等用有高牆的水泥堆肥舍堆積，便可防止幼蟲爬出化蛹。堆肥舍不但要有高牆，同時還應加蓋，以防蟲進入產卵。堆肥舍及畜舍周圍應每隔數天噴藥一次。牛舍門窗應裝紗紗。

牛蠅蠅蟲在四至十月間產卵於池沼或河岸草葉上或土壤中。孵化後的幼蟲，在水中的藻類及水邊潮濕地帶生活半年以上，到翌年晚春或初夏進入土壤中變成蛹。蛹經二至三週後羽化成成蟲，棲息在附近森林中。牛虻的撲滅非常困難，改善棲息地排水，在冬天放火燒却野草，用DDT噴射幼蟲棲息地數次或保護天敵「地蜂」，是比較有效的方法。（李永基）



，理無真在實獅金
，死(殺)創來海滄(要)卜又
，去伊捉來趕察警
。味滋嘴齒鐵入開



，氣受真着看獅金
，去澄水強硝瓶一
，是面滿彩阿(得)甲澄
。死修被明夫目及



，海滄名人情彩阿
，才人(的)今表一做生
，獅金吳着(碰)開人二
。 (怕可)害正真油加上火