



不用刀割不見血的

# 山羊簡易去勢法

王石 鉅

山羊去勢(閹)，通常都用刀割。這裡要向各位介紹的，是用橡皮帶結紮的新去勢法，不需要刀割，山羊不痛苦，不流血，農友們可以自己操作。

山羊去勢，通常都用刀割，沒有經驗的農友，一定要請閹割師來施術，所以，常常錯過去勢的適期。同時因為去勢的適期在斷乳之後，幼羊在斷乳及手術二大打擊之下，發育常受重大的影響。

下面要向各位介紹的，是用橡皮帶結紮的去勢法，不需刀割，山羊不痛苦，不流血，任何農友都可以自己操作。詳細方法如下：


準備○七公分寬的橡皮帶(可將直徑○九公分橡皮管平均割開為四條應用)，把它拉長至原來的二倍長，緊縛陰囊。緊縛部位如左下圖，即用手握陰囊頂端，盡量壓下睪丸，使陰囊下部緊張後，用橡皮帶結紮手握部位三圈。結紮部位愈離腹壁愈好。

結紮的陰囊，因血行斷絕，組織壞死，從第七、八日起發生臭氣，至第十五日最高，以後再慢慢消失。至二十日，陰囊形成大繃紋，外部角化可耐指壓。至三十二至四十三日(平均三十七、三日)，陰囊連橡皮帶脫落。陰囊脫落後，傷口尚呈紅色，但二、三日就形成痂皮，七至十一日傷口完全癒合。

這種去勢法，是利用橡皮帶緊縛陰囊，斷絕血行，使陰囊內組織(睪丸)壞死，角化後脫落，雖經過時間稍長，但方法簡便，農友自己可做，且不見血，山羊不痛苦。

採用本法時應注意事項如下：①

結紮部位如近腹壁，陰囊脫落後傷口較大，傷口治癒較慢，所以，應結紮遠離腹壁之處。②去勢最適期，是在乳中(二至三個月)；最慢也應在斷乳一個月前行。斷乳後較大的仔羊傷口大，治癒日期較久，感染細菌的機會較多。③結紮至陰囊脫落帶時一個多月，在這期間，應時常注意陰囊附近的變化，如有化膿、發炎，應即治療。但是在哺乳中實施時，大部份經過良好，不會有意外發生。




橡皮帶結紮陰囊

## 養鴨新藥

安全可靠

效力高強



衛畜藥字第000000號

預防治療劑

## 安全新生素

SAFETY NEWLY BORN ELEMENT

專用最高抗生素配合熱帶地方而成的鴨病特效藥

主治症：鴨瘟(軟腳)、白喉、赤白痢、胃腸炎、丹毒、肺炎、感冒、消化不良、其他密疫。

絕無其他副作用(保證沒落蛋)

• 全省到處均有出售!!



光洋熱帶畜牧藥物廠

彰化縣線西鄉萬埔路14-3號




臺灣總代理：

中德貿易有限公司

地址：臺北市博愛路九十八號

電話：三三一五七 三三一五八 三三一五九



富粒多 (Folidol)：適用於水稻螟蟲及一般害蟲。殺蟲效能廣泛，可防治四百餘種害蟲。