

常見的幾種

猪外科病



· · 清 法 趙 · ·

猪的外科疾病，多半由於猪舍的環境不好或管理上的疏忽而發生。發病後要趁早治療，才不會影響到猪的健康。

外 傷

猪的外傷，有因相鬪發生的咬傷，猪舍內外尖銳物體所引起的刺傷或擦傷等數種。

病狀 一般外傷，多有出血、疼痛和傷部組織受損的現象。

防治 發現有外傷，應注意發生的原因，預防再度發生。治療外傷時，請注意下列幾點：

①外傷口深及皮下時，應注意深度、大小及發生時間的長短。②仔細檢查有無異物嵌留，如有異物，應速取出。③新的傷口，應儘量保持清潔，塗碘酒或紅汞液，使傷口癒合復元。④新傷口過大、

過深，且不在活動部位（如四肢關節部位）時，應予縫合，促其早日癒合。⑤傷口出血時，須用三%雙氧水，或一至四%硼酸水以及〇.一%過錳酸鉀液等洗滌。⑥舊的傷口，如發炎化膿時，應剪除周圍長毛，徹底清洗消毒，再塗藥保護。如受傷過劇或惡化時，仍須請獸醫治療。

蹄 炎

蹄炎是因蹄冠部受傷，細菌侵入而引起的化膿性炎症，因此，本病又稱「蹄冠部化膿性炎症」。

病狀 全蹄或蹄關節發炎，跛行，患肢懸舉或以蹄尖着地，重症常致食欲減退。

防治 治療蹄炎，可用二至三%複方煤油酒精（クレゾール）洗滌蹄部後，輕者塗布碘酒，重症注射「盤尼西林」等藥，防止病情惡化。

慢性蹄球炎

慢性蹄球炎多發生於成猪，因猪舍不潔、潮濕，運動場地污染糞尿，或地面粗糙而引起。蹄球部慢性發炎，逐漸肥厚而組織崩潰，蹄底角質壞死。

病狀 角質壞死崩裂，疼痛，發生惡臭，跛行，蹄部變形。

防治 注意猪舍清潔乾燥以防發病。治療法同蹄炎。每日洗蹄後，在蹄底部塗松溜油（木タール）或用松溜油一分、橄欖油九分配合的油劑。

膿 疱

膿疱多因猪舍不潔，自皮膚傷口侵入細菌而發生。有時因體內其他部位化膿灶轉移所致。

病狀 常見猪體皮膚隆起，初期有熱痛、硬固。化膿成熟時炎症消失，用手指按時呈波動。

防治 注意猪舍及猪體的清潔，初期可塗碘酒等刺激劑，促其消散。膿疱形成後，須切開排膿，然後再用消毒藥液洗滌，填充浸藥紗布，每日換藥。但切開排膿時，須注意切口應開在膿疱的下緣，以便膿汁流出。同時可注射「盤尼西林」或磺胺藥劑，以促早日痊癒。

適合農家採用的

薺草砂藏法

——年伯李——

①擇屋內高燥陰涼的一角，先打掃洗滌清爽，用紅磚如左下圖砌邊（可不用水泥）。邊的高度視貯藏數量而定，普通一立方公尺牆角可貯藏薺草二百公斤。

②收穫的薺草，剔除破粒、小粒，分別等級，但不用水洗滌。


③取清潔半乾濕的河砂，在地面上鋪厚約一公分，把上述薺草倒在砂上，厚約二公分，再鋪砂一公分，然後再倒薺草二公分，如此層層加上，至最上層應鋪砂六公分厚。

這種貯藏法簡單易行，貯藏半年後的腐爛率最高百分之十；渡過炎熱的夏天滿十二個月，腐爛率也只有百分之五十，如貯藏二或三個月，損失很少，不會失去發芽力，可以留作種子用，也可以供蔬菜用。

如最上面一層鋪砂不夠厚，至三四月間氣溫昇高時，就會發芽生長。

沒有空

屋可以利用時，可在田間選擇高燥的地方，四面用磚塊砌邊，再照上法層層用砂貯藏後，上面及四週厚覆稻草，使日光不能直射，雨水不能浸入。



法 藏 砂 薺 草