

雨水太多地區 不宜種植梅樹



桃樹。(基隆董如葵)

【問】：(一) 基隆多雨，是否適合種植梅樹。(二) 樹苗幾何處可買？栽植距離，土壤，地位及植穴請示知。(三) 柿子是可否以接桃樹。(基隆董如葵)

【答】：(一) 雨水阻碍授粉作用之進行，不能結果因此不宜種植梅樹。(二) 梅樹在臺灣因無良好成績，故果農很少栽培。土質宜土層深厚之黏質壤土，栽植距離四公尺。宜選向陽山坡種植，植穴徑一尺一尺半，深亦相同。(三) 柿與桃親緣很遠，接不活的。(蔡啟謨)

龍眼接枝時 宜採切接法

【問】：龍眼果樹利用那種方法接枝？並請賜教(南投國姓鄉彭天生)

【答】：可在農曆二月至三月上旬採用切接法行嫁接，詳細情形請參看本刊第九卷一期及第十卷一期。(翁仁祿)

酸桔播種可分 撒播條播兩種



【問】：①酸桔採收適期何時？②酸桔種子如何採收及保管？種子採收後是否可馬上播種？以何時播種最適宜？③怎樣準備苗圃？④播種後怎樣管理？

請從種子採收至播種後的管理，一一說明為荷。(花蓮縣玉里鎮林永木)

【答】：一、酸桔果實採收時期為十一月至十二月。二、將種子取出後陰乾貯藏至翌年一二月播種亦可，但貯藏中易發霉。播種床寬一公尺，長無限制，高十五公分。先將播種床深翻整地後，混和腐熟堆肥，使床面平坦後播種。四、播種法有撒播，條播兩

種。撒播標準：每四平方公尺一公斤，條播以行間十公分株間三分為適當。五、播種後以燒土或草木灰覆土，厚二公分，四〇—六〇日發芽後噴射粉狀硫酸銨一公斤加水三十克之溶液，以防治夜盜蟲為害。六、爾後常注意間拔，除草工作，待幼苗生長至十公分時，施少量大豆餅，硫酸銨或人糞尿。七、每逢新芽萌出須噴射馬拉松乳劑防治潛葉蛾之為害。(翁仁祿)

不結果梨樹 秋冬應剝皮



【問】：一、本人種植東大梨，歷三年足，位於平地濕度與肥分良好的深格園裏，自竹東移植數處三年，每年開花數處惟未結果，未知如何栽培？二、本人想噴霧愛多收(アトニック)新豐年馬拉松混合使用是否理想，或者別有理想方法。(花蓮鄉顧明揚)

【答】：①梨樹管理法請參照本刊第十一卷第廿一期，「梨樹怎樣整枝」？不結果之樹，可在秋冬之間，將今年生之枝條，距先端一公尺之處，行寬一分左右之環狀剝皮，促進結果。②愛多收可混和馬拉松使用。(翁仁祿)

產後母猪身體弱 飼料以清薄為宜



【問】：我養一頭母豬，自從分娩後，對於食料大不感興趣，以致身體很瘦？是何原因？用何種方法增加食慾？

【答】：母猪分娩後身體非但疲憊，胃口亦不大好，所以產後頭幾天，不大吃料是不緊要，產後頭一日只給飲水或熱皮調于水中給與，以後逐日漸漸增加日糧量。同時產後的飼料以清薄容易消化為宜。俟母猪身體恢復後食慾自然增加，不必焦急。(李登元)

大肥噢



料飼助補質礦命他維合綜素生抗

售均會農店料飼

用請猪大養

卵產進促
病疾防預



所藥製源益

號二七二段三路福斯羅市北台

可樂與加裕 (コロイカル)

家禽、家畜、蛋魚、營養飼料素、強壯保健劑

製造元 白右カルシウム株式會社

強力安雛素 (ノキサリン)

鴨之球蟲症治療及預防家禽霍亂(コレラ)之預防
鴨之感冒咳嗽治療，豬之赤痢(出血性下痢症)

強力寧禽片 (ヘルミノック錠)

出品廠 大和化學工業株式會社東京工場

美耐元 (ミネゲン)

理想的綜合強力礦物素、強健多產、激滅廢鵝、促進發育、預防啄毛、防止腳弱、防止破敗卵

製造元名古屋 ミネラル飼料株式會社

日本原裝魚粉蛋白質成分50%，南美洲65%以上

日本魚精、切菜機、鷄糞乾燥機

臺灣總代理 東盈實業股份有限公司

地址：臺北市迪化街段42號