

連續死掉兩胎

母猪應該淘汰



【問】：在來種母猪一隻，體重一百四十五斤，雖有分號二次（最近有一次）沒有一隻存活的請問：①是否營養不良或受先天性病影響？②我家裡的母猪（現存）係牠的生育，從初胎至現在沒有一次像這種情形。③初胎是死胎，第二胎也是死胎，是何原因？用何方法治療？④如因母豬關係，可否淘汰，或用什麼方法預防。

【答】：據你所說的情形，你的母豬先後兩胎沒有一隻生存，像這種情形，以先天遺傳關係較大，遺傳之原因不一定單為母豬關係，所配的公豬形體亦佔一半。所以公豬之選擇亦應加注意。總之像這種連續兩胎仔豬都死去的母豬，應予淘汰為宜。（李登元）

李苗繁殖·切接芽接均可

【問】：李苗繁殖法如何？（甲）高接，（乙）壓接，（丙）誘接？①用實生李苗，②用實生梅苗，③用實生桃苗等作砧木，何種為最佳？（香港九龍阮）


【答】：一、李苗繁殖法以切接法，芽接法為普遍：①六至七月間，將桃或李種子採收，貯藏於乾燥砂中，待十一月播於苗床，覆土二公分。施肥，除草等管理得妥後，至明秋（九至十月）即可供芽接，十二月可行切接。二、

義嘉 清河春季優良種子

- | | |
|----------------|---------------|
| 早春35天結球白菜（包心白） | 日本丸葉山東白菜（一條根） |
| 長岡一號結球白菜 | 日本半結球白菜 |
| 長岡一號甘藍菜 | 日本雪白體菜 |
| 日本黑葉美濃大根（蘿蔔） | 紅仁白格二尺半長菜豆 |
| 長岡交配福壽二號トマト | 黑仁青格菜豆（訂帶尾） |
| 美國派通トマト | 八十天油甘菜 |
| 晚生白葉白骨芹菜 | 青江白菜 |
| 全年開花韭菜 | 美國大五寸人參 |
| 白脚莖菜 | 黑仁敬豆 |
| 海湖西瓜 | 白仁敬豆 |
| 牛腿胞 | 南洋田菁子 |
| 尖葉蔥菜 | 想思樹子 |
| 烏龍大號蔥菜 | 白木耳種菌 |
| 仙草種子 | 厚木耳種菌 |
| 蘇魯種矮脚木瓜 | 香菇種菌 |
| 日本切葉白菜 | 60天短種菜頭 |

李、桃及梅之實生苗等均可作為李之砧木。其中用桃砧繁殖者，耐濕性強最普遍採用。（翁仁祿）

生甘藷含多量維他命甲



【問】：關於乳牛的飼料，可以用甘藷「生」幾公斤來代替玉米一公斤的營養份。甘藷「生」及煮熟甘藷的營養和消化，及乳量有多少出入。（臺南縣柳營鄉連雅興）

【答】：一、玉米所含之碳水化合物比同量之生甘藷高約三倍，蛋白質含量亦較甘藷高五倍，但生甘藷含有多量維他命甲。二、由試驗證明煮熟甘藷對於牛胃之消化較易，但以經濟與節省時間努力以及供給維他命甲計，仍以生飼為宜。（林誠鑑）

本刊服務部小啓

劉漢傑 楊清標 李茂生 吳福朝 張老象 阮進添
湯萬福 葉標炳 李永富 蘇俊社 古超輝 楊雲山
詹德均 林規瀾 周文義 郭秋水
以上各位農友的信，已轉送專家解答，請等候本社回信。

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五一八 四號
劃撥儲金嘉字八〇〇三七號

最新感冒鎮痛劑

太平洋牌

感風片



Kam Fon

治療感冒的秘訣是早治，當您有噴嚏，流鼻涕，鼻塞，頭重，咳嗽的現象時，請速服「感風片」，必能立刻痊癒。

是隨身的好護士

主治：

流行性感冒，四季感冒，鼻尖，頭痛，發熱，關節炎，偏頭痛，齒痛。

衛藥字第2047號

太平洋製藥廠
臺北市山北路1段105巷90號