

的歷史，但是為什麼可怕的豬瘟，還會偶然發生？

經調查分析的結果，主要原因就在少數農友對「鬼化疫苗」沒有充份的了解，深怕不良反應而拒絕注射。

注射「鬼化疫苗」，部份猪隻確會發生反應，但是發生的程度很輕，即使不加治療，經一、二日後也能自然恢復。據統計，自普遍採用「鬼化疫苗」以來，全省總注射猪數已經超過一千二百萬頭，而發生反應的，只有三%，至於在注射後十日內死亡的，則不超過〇·三%。所謂注射反應，實比一般人所傳說的頗有出入。

避免「反應」注意二點

而且事實上，所謂注射反應，多因注射猪瘟潛伏期中或已感染其他疾病的猪隻，或在注

射反應期中併發肺炎而發生。本人在實驗室試驗大猪、小猪共約二千隻，還沒有發現過純粹因注射「鬼化疫苗」而引起死亡的例證。所以，要防止因注射而引起的損失，最重要的還是各位農友與獸醫人員的合作。下面二點，可供各位參考：

一、健康的猪才能注射 健康的猪隻，六星期齡以上即可注射。懷孕猪、衰弱猪、食慾減退或體溫不正常的都不宜注射。注射前應先行猪的健康檢查。

二、注意注射後的健康情形 注射十天內，應密切注意猪的健康情形。如果發現食慾不振或精神不佳，應即通知獸醫人員前往診治。請注意反應開始日期，及有否併發其他疾病。反應過長時，易於末期併發肺炎。如果不幸而死亡，請將屍體供給獸醫人員解剖，查明死亡之真正原因。

茼蒿是生食蔬菜 不宜施用人糞尿

△「茼蒿」是一種生食蔬菜，請不要施用人糞尿。臺北區農業改良場曾作「茼蒿」肥料試驗，認為尿素最好，品質和產量都不比施人糞尿的差。每十公畝地需十六至二十公斤尿素，分為五次施用，從「茼蒿」出土之後，每隔四至五天施用一次。在澆水時，與水混合施用，則可節省勞力，但是濃度不能太高。水一千公斤尿素一公斤，是最好的混合比率。

△「茼蒿」也不施用硫酸銨，因為「茼蒿」不耐酸性，並且怕「硫酸根」，所以施用硫酸銨後，不但品質差生育慢，產量也低。

△「茼蒿」在六月中、下旬播種，到八月上、中旬就可收穫，價錢很好。但是在六月播種時，需要浸種二十四小時後再行催芽（剛剛萌芽即可），且須勵行畦面覆蓋（用稻草疏疏的覆蓋），並應經常澆水。

△「茼蒿」在本省有兩種，一是「青種」，另一是「紅種」。採用「青種」為佳。△「茼蒿」病蟲害雖少，但是常有蚜蟲為害。所以，應從生育初中期起噴射「馬拉松」與「大生七八」混合液二至三次（收穫前十天不可噴射）。

△從播種至採收所需要的日數是：①六—七月播種者需三十一—三十五天，②八—九月播種者需三十五—四十天，③十一—十二月播種者需四十五—五十天，④十二以後播種者需五十五—六十天（王進生）

六月下種八月收


銷路暢旺價錢好



，猶家大詩歌吟（安）卜
，（友農）兄田做位各勤奉
，行通喚萬千（場賭）開激
。聲名好業建錢有



，賢在資搜順哥順
，樓（建）起（和）甲地買錢有
，（情為難）笑見真蕭想江阿
。（錢賭不）跟蹤喚過改此從



，（勞勤）勢倒真人做哥順
，理生兼（再）開又田做
，矩規守儉節勞勤
。喜歡真足充食衣