

之廿六。

嘗試試驗結束之後，從有虱組中取出的兩隻卵雞，分別放入一隻狹匣內，撒以殺虱的粉劑，然後點數虱子的數目，結果發現有一隻母雞身上的虱子有兩萬四千六百廿七隻，另一隻母雞則有兩萬一千五百頭虱子。

虱子在溫暖的氣候下，繁殖最快，因此養雞的人在春夏兩季，要仔細的檢查雞群，如果發現它們已有虱子寄生，應即在雞身上撒布百分之四的馬拉松粉劑（勿使藥粉落在飼料或飲水上），以為防除。（World Farming）

柑桔種子發芽能力

可用藥劑迅速測定

利用一種白色粉末狀，能在水中溶解，叫做 2,3,5, triphenyl tetrazolium Chloride 的化合物，可以很快地鑑定柑桔的種子，是否還有生活力。把柑桔種子縱切為兩半，投入這種化合物的水溶液中。假使種子還有生活力，切面上的酵素因與溶液反應而呈紅色，如果沒有反應而保持原色，那就說明種子已失去生活力。

上述的實驗結果，在商業上試用後，認為對於估計種子的發芽率，很有幫助。（California Agriculture）

雞蛋數量和品質

受養雞環境影響

根據美國洛島大學一項試驗，將相等隻數的洛島紅及來航種小母雞，分別飼養在普通雞籠及鋪設木板的雞籠內，飼餵同樣的飼料，經過三三五日測定結果，在地板上飼養的產卵較多。

產卵母雞，在溫度每日變換的情況下，所產雞蛋的蛋壳品質，較溫度經常保持華氏七十至七十五度的略佳。


產卵母雞個別籠飼所產的「血斑蛋」較集體籠飼的更多。美國華盛頓州立大學，曾用不同大小的

雞籠單獨或集體飼養母雞，結果證明血斑發生率，以單獨飼養母雞所產的為高。（李邦詮譯自 Poultry Tribune）

草莓立體栽培新法

鐵絲網搭成塔形的「網架」，外面用水泥固定，然後在特別配製的培養土中，一層一層的種植草莓，這是美國園藝家所用的「草莓立體栽培」新法。這種方法，適合庭園或溫室中小規模栽培草莓，生長快，結果時間長，管理方便，不受病蟲鳥害及氣候的限制，而最大的好處，是草莓不易和土壤接觸，清潔衛生，最適生食之用。

「網架」可以利用鋁片、磚、竹竿或木板等較為簡便經濟的材料。除了實塔型外，也可以搭成疊餅型、桶型或支架型。立體草莓栽培成功後，綠色的果莖上，點綴着鮮紅的草莓果，在「網架」上排成美麗的圖案，也可以作為很美麗的庭園佈置。適合立體栽培的草莓品種有：Pocahontas, Catskill, Redglow, Fairfax 等。最新奇的要算德國園藝家 Reinhold Hummel 育成的 Sonjama 蔓生性品種（左圖），可以攀生在籬笆、圍牆或陰棚上，也可以種在花盆裏，使它攀生在你的窗戶欄杆上。（生健取材 Popular Gardening）



蔓生性草莓的新品種

農藥的有效施用

請混合

日農特製リノ一展着劑

（日農特製利農展着劑）

包裝：100cc瓶裝，每箱60瓶入
500cc瓶裝，每箱25瓶入

特點：◎懸浮性、濕展性、固着性優良……………最好用
◎稀釋倍數5000倍—10000倍
用量少許，所費不多，能增強貴重農藥的效果……………最經濟
◎無論任何水質，都能使用，可與一切殺蟲劑、殺菌劑、荷爾蒙劑、微量元素劑，混合施用……………最安全
進口原裝，現貨供應

出進口商 泰洋股份有限公司

臺北市重慶北路二段一〇八號
電話：44994號

品種確實

興農春季優良種子

長岡交配一號甘藍	白皮ニユメロン	馬哪里
長岡交配秋時甘藍	萬國メロン	皮亞遜
花胡瓜	黃香瓜	普立杏
四葉胡瓜	粗米苦瓜	馬哪里西八月供
立秋胡瓜	米筒型絲瓜	應種子
潮洋刺瓜	包心白菜	日本長岡交配
內刺刺瓜	清明包心白菜	酒壽二號
興農青長刺瓜	大粒甜椒	赤福一號
加州大甜椒	興農榮譽種	赤福三號
甘味大甜椒	夏威一號	大型赤福
日本輸入甜瓜	美國トマト	世界一號

輸入元 林興農股份有限公司

興農種子行

本行 臺北縣三重鎮重新路一段四三號
分行 員林 鎮光街七號
郵政劃撥四〇二八號