




來信請用明信片
信中免寫客氣話
書明姓名和住址
信封上註「農問」

在傳染病潛伏期中

鴨有產軟殼蛋現象



【問】：我的陸地鴨，自去年底起，有將近三分之一之鴨，因蛋殼較正常鴨蛋略薄，故產後即為其鴨隻所啄食，損失至大，不知原因何在？

另有下列數點，亦請作答為荷：一、長期餵予

煮熟之新鮮魚頭（小鯊魚）會否導致此種現象？二、某鴨生軟殼蛋，其他鴨隻搶吃後，會否亦受影響而生軟殼蛋？三、生軟殼蛋會否成爲一種習慣？四、飼料不潔會導致生軟殼蛋？五、是否輸卵管發炎，應如何防治？六、是否因爲鈣質吸收力弱而有此現象？七、如係鴨隻鈣質分泌力差，應如何補救？八、究係何因而生軟殼蛋，懇請指導。（雲林北港陳家莊）


【答】：鴨隻亦有間歇產生軟殼蛋的情形發生，據你所述，不是缺乏營養所致。未知你的鴨群是否曾舉行家畜霍亂及新城病之預防注射？鴨隻在傳染嚴重的傳染病之潛伏期中，有產軟殼蛋的情形發生，應加特別注意。所詢各點簡答如下：

一、長期餵熟新鮮魚類，不會導致此現象。二、鴨生軟殼蛋應即取去，以免養成吃蛋的惡習，但搶吃亦不會影響生軟殼蛋。三、生軟殼蛋不是一種習慣，但初產卵時，軟殼蛋的情形比較多。四、飼料不清潔可致

其他疾病，但不會導致生軟殼蛋。五、輸卵管發炎是有可能，可給予口服消炎片，每鴨每日兩片，連續給三日即可治癒。四、鴨隻體弱，可能對於鈣質吸收能力差是有此現象發生。七、如因體弱，在管理上使之康復，即可恢復正常，如果是遺傳關係，對於鈣質分泌力差者，則無補救辦法。八、據你所說的情形看來，很可能是體弱抗病力差，而有病之潛伏期的緣故。（李登元）

母豬不正常發情

應從營養上矯正



【問】：（一）我飼養母豬一頭（桃園種），雖到生殖年齡，發育各方面均健全，但一直不曾發情，臨近數頭母豬亦同樣情形，請問是何原因？

（二）後來請獸醫注射上

發情。據云以這種方法發情配種，較自然發情不正確，是否事實？擬俟二十天後自然發情再交配，但到時候又不發情，有何方法使之自然發情？（桃園縣觀音鄉廖克明）

【答】：（一）母豬不發情可能是長得太肥胖，腹內脂肪太多，卵巢發育受阻礙，主要原因，可能是飼料中碳水化合物飼料過多，缺少蛋白質飼料。

（二）來函所說，經注射促進發情荷爾蒙後即發情，但經二十天後又未發情，此種



中農化五廠出品

農藥成份標準
保證品質優良

巴拉松乳劑

P M 乳劑

195%安特靈乳劑

馬拉松乳劑

大生七十八粉劑

魚藤精混合乳劑

總公司：台北市南陽街廿一號 電話三一六六〇 五廠台北縣景美鎮萬隆里

經銷處


- | | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------------------|---------|---------|
| 臺北市永昌街二號 | 蓬萊農產行 | 電話46732 | 臺中市興中街13號 | 國家農藥行 | 電話4384 |
| 桃園縣新屋鄉新生村 | 建德農產行 | 電話39 | 南投縣南投鎮民族路113號 | 泰生保苗堂 | 電話22 |
| 桃園縣龍潭鎮龍元路25號 | 東興農產行 | | 南投縣竹山鎮雲林路30號 | 新進商行 | |
| 新竹市東門街73號 | 大豐興行 | 電話600 | 雲林縣虎尾鎮光復路43號 | 惠豐農藥行 | 電話238 |
| 新竹縣新埔鎮中正二巷12號 | 大東日榮行 | | 嘉義縣民權路六甲村三鄰199號 | 年豐農藥行 | 電話17之1 |
| 苗栗鎮大同路16號 | 榮發行 | | 嘉義縣民權路中樂村民生路21號 | 瑞芳種子部 | |
| 苗栗鎮勝利里71號 | 日榮行 | | 臺南市公園路173號 | 蓬萊農藥行 | 電話3497轉 |
| 豐原鎮田心里田心路39號 | 資豐年行 | | 高雄市中正路180號 | 富源農藥行 | 電話3169 |
| 臺中縣霧峰鄉中正路327號 | 美豐行 | 電話63轉 | 高雄縣鳳山鎮第一市場內 | 慶豐西藥行 | 電話505 |
| 連路處①員林鎮中正路90號 | 廖秋種子行 | | 屏東市長春里民生路86號 | 和豐碾米廠 | 電話536 |
| ②永靖鄉中山路 | 廖秋種子行 | | 屏東縣內埔鄉文化路18號 | 農友生產服務社 | 電話10 |
| ③屏東市民生路194號 | 美豐行分店 | | 臺南鎮中華路219號 | 豐榮農藥行 | 電話553 |
| | | | 花蓮市中山路臨8號（彰化銀行對面） | 邱協成種子行 | 電話75 |

情形，很明顯由於促進發情荷爾蒙的缺少，此種現象除非先天遺傳外，大多數由於飼養管理上之錯誤。

(三) 從營養上予以矯正，給以青料蛋白質補充飼料，礦物質如鹽、骨粉等，母豬的運動也不可忽視。(林誠華)

柑柑不耐貯藏

採果必須小心



【問】：柑柑每粒包玻璃紙或蠟紙，然後放在水泥地上，或木箱裏面，再佈滿一沙，這樣，柑柑是否可以用久藏二個月不會變壞爛掉？(新竹縣竹東鎮郭港池)

【答】：柑柑不耐貯藏，在常溫下不能貯藏到五、六十天之久。最好的方法為採果時注意不碰傷，小心經過篩砂溶液消毒後裝罐，貯藏於冷藏庫中，最能放久。包紙後放在冷藏的地方，加上細砂，固然可以延長貯放時間，但恐怕不能太久。為了不使很快腐爛，採果處理必須特別小心，表皮一經擦傷後即易腐爛。(陸之琳)

長期施用化學肥料

土壤可以減低鹼性



【問】：我今年種植約二分地的柑柑，其表土P.H.六·八至土P.H.七·二。請問一、是否需使它成為最好的酸度六·五到五·五。二、若需要，用什麼方法？(高雄縣路竹鄉王元全)

【答】：P.H.六·八—七·二之鹼性土壤，雖可利用硫酸，使它成為P.H.五·五—六·五之微酸性土壤，但操作繁雜，不實用。二、新開墾之鹼性土壤，經長期之化學肥料(硫酸銨等酸性肥料)施用後，自然減低鹼性，而增加酸度。(翁仁祿)

牛找仔品種最強

適於颱風季栽培



種？

四、「牛找仔」是否就是俗稱「早生馬耳四十日找仔」呢？

五、該種每分地收量若干？可否連作？六、夏季播種是以何種方式最優？方法如何？原因何在？

七、國歷四月至六月可否播種上述品種，應注意些什麼？(彰化縣溪湖鎮陳新利)

【答】：一、每分地施用六十公斤之氮氣化鈣，作為栽培夏季蘿蔔並無影響，但施用時須注意幾點：①下雨之後不可施用，俟地面乾後施用，並施用後(全園撒)立即耕耘攪拌，使氮氣化鈣與土壤充分混合。②不可作全園撒佈，施用後放箭過夜才耕耘，因在夜間露水及地面的水分，會使氮氣化鈣變成薄層，致使耕後無法與耕土充分混合。③須於播種前十二天施用。

二、栽培優良品種蘿蔔，例如大白找，六十日仔等，可耐鹼性(P.H.六·五—P.H.七·二)，不耐鹼性。在鹼性土壤，不但生育不好，而且容易發生粗皮。播種前用三五公斤的噠必達(ヘブタ粉劑)處理土壤，減少黃條葉蜜之發生。

三、砂質壤土，於夜間雖易於乾燥，但於夜間因毛細管現象的關係，可獲水分，生育好，故蘿蔔適於砂質壤土栽培，若再有灌溉設備，其產量一定高，但灌溉時期宜俟地溫降低後，行畦間灌溉。

四、牛找仔的別名是早生馬耳，或叫做馬耳找仔，在臺中及臺南地區栽培較多。味

世界首創！植物蒸散抑制劑

現代農業不可缺少之營農資材。
日本「不二合成」榮譽出品
(專賣特許 發明協會選定品)

久 綠 拿 Greener



※「農復會」正大量採用推廣中!!

原裝：一公升、四公升、十八公升三種

▲特效及用途

- ◎防止稚幼植物，在移植時枯萎凋謝。
- ◎使苗木在長途運送，活生生得送到種植地。
- ◎使青菜，生果類保持鮮度。(現有姊妹品富麗鮮專用)
- ◎防止蔬菜、青果、菸草、水稻、陸稻等一切農作物，在移植時的損害及枯死，同時促進最高成活率。
- ◎保護植物不受旱害、霜害、鹽害等。
- ◎加強植物對其他農藥噴射的附着力。

製造元：不二合成株式會社
輸出元：株式會社永順商會
臺灣總代理：永友商行

◎東京「不二合成株式會社」及「株式會社永順商會」駐臺代表處：臺北郵箱1770號

鮮度保持劑(青果·蔬菜類等)

生果青菜外銷不可缺少之鮮度保持劑。
(日本食品衛生法指定品)

富 麗 鮮 Fresher



▲特效及用途

- ◎防止萎凋及重量減少。
- ◎保持如收穫時所有的天然外觀鮮度。
- ◎防止過熟所受損失，延長貯藏期間。
- ◎防止發生青黴及腐敗傳染於其他果菜
- ◎減少運送中，青果類蔬菜等之擦傷及皮面的損傷。
- ◎一般果類，例如柑桔、香蕉等之鮮度保持。

說明書備索

東京都豐島區日出町3の149
電話(971) 9769 (983) 1908
東京都千代田區神田東松山下
町三五電話(291) 8773
臺北市中正路 1691 號
電話：3 6 7 6 7