


情形，很明顯由於促進發情荷爾蒙的缺少，此種現象除非先天遺傳外，大多數由於飼養管理上之錯誤。

(三) 從營養上予以矯正，給以青料蛋白質補充飼料，礦物質如鹽、骨粉等，母豬的運動也不可忽視。(林誠華)

柑柑不耐貯藏

採果必須小心



【問】：柑柑每粒包玻璃紙或蠟紙，然後放在水泥地上，或木箱裏面，再佈滿一沙，這樣，柑柑是否可以用久藏二個月不會變壞爛掉？

(新竹縣竹東鎮郭港池)

【答】：柑柑不耐貯藏，在常溫下不能貯藏到五、六十天之久。最好的方法為採果時注意不碰傷，小心經過篩砂溶液消毒後裝罐，貯藏於冷藏庫中，最能放久。包紙後放在冷藏的地方，加上細砂，固然可以延長貯放時間，但恐怕不能太久。為了不使很快腐爛，採果處理必須特別小心，表皮一經擦傷後即易腐爛。(陸之琳)

長期施用化學肥料

土壤可以減低鹼性



【問】：我今年種植約二分地的柑柑，其表土P.H.六·八，表土P.H.七·二。請問一、是否需使它成為最好的酸度六·五到五·五。二、若需要，用什麼方法？(高雄縣路竹鄉王元全)

【答】：P.H.六·八—七·二之鹼性土壤，雖可利用硫酸，使它成為P.H.五·五—六·五之微酸性土壤，但操作繁雜，不實用。二、新開鑿之鹼性土壤。經長期之化學肥料(硫酸銨等酸性肥料)施用後，自然減低鹼性，而增加酸度。(翁仁祿)

牛找仔品種最強

適於颱風季栽培



種？

四、「牛找仔」是否就是俗稱「早生馬耳四十日找仔」呢？

五、該種每分地收量若干？可否連作？六、夏季播種是以何種方式最優？方法如何？原因何在？

七、國歷四月至六月可否播種上述品種，應注意些什麼？(彰化縣溪湖鎮陳新利)

【答】：一、每分地施用六十公斤之氮氣化鈣，作為栽培夏季蘿蔔並無影響，但施用時須注意幾點：①下雨之後不可施用，俟地面乾後施用，並施用後(全園撒)立即耕耘攪拌，使氮氣化鈣與土壤充分混合。②不可作全園撒佈，施用後放箭過夜才耕耘，因在夜間露水及地面的水分，會使氮氣化鈣變成薄層，致使耕耘後無法與耕土充分混合。③須於播種前十二天施用。

二、栽培優良品種蘿蔔，例如大白找，六十日仔等，可耐鹼性(P.H.六·五—P.H.五·二)，不耐鹼性。在鹼性土壤，不但生育不好，而且容易發生粗皮。播種前用三五公斤的噠必達(ヘブタ粉劑)處理土壤，減少黃條葉蜜之發生。

三、砂質壤土，於夜間雖易於乾燥，但於夜間因毛細管現象的關係，可獲水分，生育好，故蘿蔔適於砂質壤土栽培，若再有灌溉設備，其產量一定高，但灌溉時期宜俟地溫降低後，行畦間灌溉。

四、牛找仔的別名是早生馬耳，或叫做馬耳找仔，在臺中及臺南地區栽培較多。味

世界首創！植物蒸散抑制劑

現代農業不可缺少之營農資材。
日本「不二合成」榮譽出品
(專賣特許 發明協會選定品)

久 綠 拿 Greener



※「農復會」正大量採用推廣中!!

原裝：一公升、四公升、十八公升三種

▲特效及用途

- ◎防止稚幼植物，在移植時枯萎凋謝。
- ◎使苗木在長途運送，活生生得送到種植地。
- ◎使青菜，生果類保持鮮度。(現有姊妹品富麗鮮專用)
- ◎防止蔬菜、青果、菸草、水稻、陸稻等一切農作物，在移植時的損害及枯死，同時促進最高成活率。
- ◎保護植物不受旱害、霜害、鹽害等。
- ◎加強植物對其他農藥噴射的附着力。

製造元：不二合成株式會社
輸出元：株式會社永順商會
臺灣總代理：永友商行

◎東京「不二合成株式會社」及「株式會社永順商會」駐臺代表處：臺北郵箱1770號

鮮度保持劑(青果·蔬菜類等)

生果青菜外銷不可缺少之鮮度保持劑。
(日本食品衛生法指定品)

富 麗 鮮 Fresher

姊妹品
人畜無害



▲特效及用途

- ◎防止萎凋及重量減少。
- ◎保持如收穫時所有的天然外觀鮮度。
- ◎防止過熟所受損失，延長貯藏期間。
- ◎防止發生青霉及腐敗傳染於其他果菜
- ◎減少運送中，青果類蔬菜等之擦傷及皮面的損傷。
- ◎一般果類，例如柑桔、香蕉等之鮮度保持。

說明書備索

東京都豐島區日出町3の149
電話(971) 9769 (983) 1908
東京都千代田區神田東松山下
町三五電話(291) 8773
臺北市中正路 1691 號
電話：3 6 7 6 7