

道淡，辛味在本地種植為品種中最強但，播種後四十五天左右就可收穫，適於颱風季節當作短期作物栽培。

五、每分地的產量約一五〇〇—二一〇〇公斤左右，若有發生軟腐病不可連作，四十天左右的產量較牛找仔低。

六、夏季栽培可用條播或撒播，但播種後宜用稻草，稀稀覆蓋畦面，發芽後不必除去，作為下雨時保護土壤之沖洗，及避免泥土附着葉背，而阻礙呼吸作用及病菌之侵入。

七、牛找仔，六十日耐熱性強，而且在高溫時，根的肥大速度很快，肉質尚嫩。


促進荔枝結實

可施行接枝法

【問】：一、本鄉有一位農友，種植荔枝一百餘株，其株齡已有六年餘，每年都會開花，而不結實，是何原因。

二、荔枝不結實是否可接枝呢。

（六甲鄉陳錦城）



【答】：一、最初開花的一、二年，因樹齡還小，不結果實，不足為異。照來函所述，原因可能是這位農友施肥太少。像這樣大小的荔枝樹，每株一年應施堆肥三〇公斤，大豆餅二、四公斤，過磷酸鈣一、一公斤，草木灰三、五公斤。二、每株荔枝接三四株實生荔枝苗，是有好處的，可以減少風害，增進樹體營養，促進結實。（蔡致誠）

黃皮繁殖法

分實生嫁接兩種

【問】：（一）黃皮及衛桃（形似枇杷，果略大而圓，中空有核肉薄，果實微黃帶白）是否實生？無須嫁接，多少年才結果？正當收穫量每株平均若干？黃皮中，有長形，有圓形，究以何種具栽培價值？

（二）常見市上出售黃皮，皆有蜘蛛及螞蟥，且果實細小，不甚美觀，應如何改進

？（香港阮甘泉）

【答】：一、黃皮的繁殖法，有實生和嫁接兩種，蒲桃（又名番果，屬桃金娘科）可用實生、扦插、高壓及嫁接等法繁殖。這兩種果樹的優良品種，都應該用無性繁殖法繁殖，而不用實生法。黃皮和蒲桃的實生株，大約在七年生時開始結果，但嫁接株在四、五年生時就會結果。


果樹品種的優劣，可以從：①果實大小及外觀；②果肉品質及風味；③是否豐產等性狀去判別。

（二）這種黃皮，大概是從實生株上所產，改進的途徑，是選拔優良母樹，應用無性繁殖法繁殖推廣。有蜘蛛及螞蟥，可在幼果發育中時，噴佈滅定旺（Reodon）三六〇倍液或益加津（Ectatin）防治，隔一個月再噴一次。果實成熟前十天內不要噴藥。（蔡致誠）

茶園噴撒農藥

應在採茶以後

【問】：茶園農部，因天氣變化，發生吊包蟲害，吸食茶葉，非常嚴重，使用農藥巴拉松，魚藤精乳劑，混合水一千倍，撲殺後未見效，是藥液過輕，或有其他較好他藥劑，請研究答覆。（新竹縣竹北鄉李源泰）



【答】：一、寄來蟲樣（見本）為避債蟲（吊包蟲）二、像你茶園發生這類蟲不多，最好用人力捕捉，儘量避免用藥。三、根據平鎮茶業試驗所試驗結果，用四七%巴拉松乳劑，加水一〇〇〇倍，防治該蟲甚為有效（魚藤精乳劑對該蟲無效）。四、茶園噴撒巴拉松類藥劑時，應特別注意：①最好先行採摘然後再噴藥②噴藥後應隔三星期不可以採茶。（胡家愈）

仔猪受寒


不致傳染

【問】：一、養猪的豆餅，是以打開成塊


大肥肥

抗生素綜合維他命礦質補助飼料

飼料店，
農會均售



促進產卵
預防疾病



益源製藥所

台北市羅斯福路三段二七二號

最受四健會會友們歡迎的

四健牌 超級完全配合飼料

含有美國最新雞用藥 Nf-180 可預防球蟲病、雞白痢、氣管炎等十三種雞病，並促進成長，改良肉質，增加產卵。



小雞用一 可獲百分之百的育成率。



中雞用一 健壯骨骼、卵巢、輸卵管。



生蛋用一 提高產卵率確保養雞實利。

總經銷：永裕大藥房 臺北市漢口街一段61號

製造廠：四健飼料股份有限公司 臺北市北平路30號