



給食好，還是浸水後飼給較好。二、聽說切碎，再經過煮熟給予，比其方法都比較快肥，是事實嗎？三、仔豬常頭鑽入草裡有似感冒，經獸醫注射生

素藥即愈。此病有傳染否？如何預防呢？有無服用藥劑？如有那種藥較好。

【答】：豆餅在乾飼之情形下，以磨成粉狀為佳，如果打成塊狀給食，則沒有浸于水中過一夜的好。煮熟固然好，但增加燃料費與勞力。所以豆餅浸水後連水與飯，比較方便合適。

至於仔豬怕冷可能是受寒的緣故，既經治療是不會有傳染的。(李登元)

豆餅蛋白質豐富

但無催肥作用

【問】：一、猪隻業經長成，只待催肥出售，給於何種飼料可達催肥目的？二、豆餅對猪是否有催肥作用？在飼料中佔何比例？

豆餅對飼猪之作用在小猪階段如何？中猪階段如何？大猪階段如何？(臺南空供部看守所)

【答】：一、猪隻催肥，可用畜牧教材「如何養肉猪」所列標準第三期之飼料。

二、豆餅為含蛋白質豐富之飼料(粗蛋白質含量佔四一%)無催肥作用，主要為供構成肌肉所需之養分，在飼料中所佔比例，視猪隻生長發育階段而不同。在小猪階段最為重要，約佔全部飼料二一%，隨猪隻之發育飼料量宜予減少，中猪階段約佔全部飼料量一六%，催肥階段，不宜超過一〇%。(周光宇)

梅以果大肉厚者為佳

【問】：一、橘子、荔枝、梅子等三種樹，於定植時，所需平臺階段之寬度，是否一樣？如不一樣，其寬度各為多少？二、臺東東河鄉北源村是否宜於種植梅子，梅子應於什麼時候定植？何處可買苗？何品種最好？種

上後幾年開始結果？壽命多少年？銷路如何？何處可買到有關參考書籍(種梅及管理)？(臺東東河鄉時澤臣)

【答】：一、梅及柑橘不屬階段，宜寬二十至十四尺，荔枝宜寬十六至十八尺。

二、梅是溫帶果樹，並不很適宜在臺東種植，最好種在較寒冷的山地，品種以果大肉厚者為佳。定植宜在冬季，嫁接苗種後三年開始結實。果實出路供加工製造梅酒、梅乾、蜜餞等，目前是供不應求。參考書：「果樹栽培圖說」(日文)。(蔡致誠)

烤室熱源以電熱最佳



【問】：一、在房屋內建造六尺高，六尺長，九尺寬之烤室時，其烤火之設備如何為最善？二、如建造烤室在屋內採用何種材質？三、如黃香蕉放入烤室要烤、烤室內之溫度是須要調節何度？四、黃香蕉放入火烤室後，至

成為香蕉干之時間中，烤室內之溫度是一律同溫度，或是須要變度調節？五、關於烤香蕉應注意何事項？(臺北市林清泉)

【答】：一、烤室熱源以用電熱最佳，炭火亦可，但必須有空氣循環裝置。設備可用山制式熱風乾燥法。二、可用木材，輕質木材，硬質木材亦可，但要有防熱保溫裝置。三、溫度應在攝氏六〇—八〇度之內。四、溫度必須調節。五、注意：①色澤問題，如用硫磺或亞硫酸水處理以求色澤美化，防止黑變。②注意乾燥溫度。③注意香蕉之成熟度。(朱仙和)

讀者服務部小啓

吳英波 賴寬金 陳瑞泰 李阿輝
張雙林 陳漢 林金獅 鄭利益
顏逢春 劉高疆 劉伯年
以上各位農友的問題，已送請專家解答，請等候本社的回信。

在來種稻熱病特效藥

大好年

(ダイコーネン錠)

製造元 日本三登化學工業株式會社

總經理 裕隆商行

注意：避免與安特靈等有機鹽素劑混合最好單獨使用

- 特點：
- 一、絕無藥害(據50年度臺中區農業改良場試驗報告)
 - 二、藥效優秀(據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告)
 - 三、提高產量(據50年度臺中區農業改良場試驗報告無發生病害區增收七%)

臺中市建國路一六七號
電話：四八五五號