
農業問答

來信請用明信片
信中免寫客氣話
書明姓名和住址
信封上註「農問」

葡萄園下可種苦瓜



【問】：畑裏的葡萄園下可種苦瓜嗎？在何時播種？距離多遠？是不是也要再施肥？

【答】：（一）利用初生葡萄種植苦瓜是可以的，在貴地的苦瓜播種期，是八月—翌二月，最好先催芽後播種，並在播種穴北邊用稻草作防風屏，以防幼苗受冷風被害。利用葡萄的行間的關係株距，宜採用一·八—二·〇公尺。


（二）雖然葡萄已經施下肥料，但苦瓜在生育初期，中期均無法吸收，故仍請每株最少施用堆肥十—十五公斤，過磷酸鈣一〇〇公克，氯化鉀二五—三〇公克作基肥為宜，俟本蔓二—三枚，開始用尿素追肥，每株約三〇—三五公克，繼續施用三次左右，以促生育及瓜果之發育。（王進生）

馬鈴薯的催芽約需一週時間

【問】：馬鈴薯應如何催芽？催芽至何種程度才適於下種？（臺東成功鎮孫彥波）

【答】：（一）本省現有五峰種，休眠期間短，故早期栽培，若採用該種，無須催芽。（二）普通為打破休眠而提早定植時，宜用エチクロリン催芽。將切斷之種薯，浸漬於エチクリン一至三%溶液三十分鐘後，放置溫度攝氏二十度左右之溫床或冷床，二星期左右就萌芽，芽之長度一—二公分，不可過長。（三）為使發芽整齊，宜用トランスプラント液處理催芽，トランスプラント一〇公克，芽一五〇公斤，連箱浸漬六小時然後拿出，打開種薯箱，將種薯與砂堆積於空隅，但不可堆積過厚，上面覆蓋草蓆，催芽期間約一星期左右就可。（王進生）

本省氣溫太高出產良梨困難



【問】：（一）敬請供給些水梨、紅肉李之施肥，病蟲害防治資料。（二）在新店海拔四五〇公尺準備高冷山地，種水梨（已種二年）有無結果希望，臺省何以沒有良好水梨出產。（臺北梁繼壎）

【答】：（一）請參閱「臺灣農家便覽」「果樹栽培圖說」「果樹病蟲害圖說」等書，皆日文。中文書不久農林廳將出版「農業要覽」的「果樹篇」，都有這些資料。（二）若是山坡地，只要不是向北方，而且能避免強風，可望結果。這有一點須注意，就是當梨樹開花的季節，在新店是否常遇下雨，若如此，梨樹雖開花滿樹，結果也

養鴨新藥
安全可靠
效力高強
衛畜藥字第〇〇号号
預防治療剤
安全新生素
SAFETY NEWLY BORN ELEMENT
專用最高抗生素配合热帶地方而成的鴨病特效藥
主治症：鴨瘟（軟脚）.白喉.赤白痢.胃腸炎.丹毒.肺炎.感冒.消化不良.其他雜疫.
絕無其他副作用（保証沒落蛋）
• 全省到處均有出售!!
CSC 光洋熱帶畜牧藥物廠
彰化縣線西鄉寓埔路14—3號

永光農葯 TRADE MARK 信用最好
省政府檢驗合格農葯
核准登記證007 025 026號
パラチオン 巴拉松 乳劑 47%
ピーエム PM 乳劑 50%
マラソン 馬拉松 乳劑 50%
進口外國農藥大生、可利生、稻熱病用錠劑西藥生展着劑
進口優良農藥"好殺松50"（ホスチオン）鋁瓶裝
永光農化工廠
台中市成功路276號 電話4661號