不會多，因雨水妨害傳粉作用，本省因氣溫太高，雨水又多，梨樹發育期長，到了冬季又不能充分休眠，故結果不多，品質也差。溫帶許多梨的優良品種，都不適應臺灣這種環境，因此沒有良梨出產。（蔡致謨）

蘆筍需要低溫冬眠

【問】：我住在海拔七百八十公尺，請問種植蘆筍是否相宜？砂礫地帶可否種植？種子應向何處選購？

【答】：（一）貴地氣候條件似頗適合「蘆筍」栽培；因爲蘆筍在冬季，需要平均溫度攝氏十五度以下四個月，始獲得良好休眠，在生育期，攝氏十八度以上，至攝氏三十二度均不妨碍出筍。除了極多的砂礫以外均可栽培。種子可向臺灣農產企業公司，或興農種子行採購，一畝地播種量二—三合，一臺兩新臺幣貳拾元，一公畝種子需要一臺兩。（王進生）

卵鷄飼養過肥影響產蛋數量



【問】：我所飼養之來亨及紐罕西，多肥胖而寡產，是否與飼料有關，請賜給生蛋鷄飼養配合單，以便改進。據說臺北市養鷄者，多用人工爲鷄授精，其方法爲何？何處有傳授者，敝人擬前往學習，敬請賜予答覆爲禱。（湖口德勝村杜鷄翩）

【答】：來杭鷄是卵用種，不應胖而寡產，紐罕西是卵肉兼用，雖寡產，但肥胖仍有可取之處，鷄舍肥胖過早，或許是在幼雛時，給予的硫水化合物飼料，如玉米等太多的關係，另如運動不足，也易肥胖，故可能是飼養及管理不善所致。

產卵鷄的飼料配合，可簡述如下：

（二〇週以上，每隻產卵鷄的每日給予量）

飼料名稱	配合率	數量(公分)
玉米	三〇%	三一一·三
小麥粉	一五%	一一·五六
碎米	一五%	一一·五六
豆餅	一二%	一三—一三·三
脫脂奶粉	五%	五·五—五·五
蔬皮	一〇%	一〇—一二
脫脂米糠	一〇%	一〇—一二
魚粉	一〇%	一〇—一二
骨粉	二%	一·一—一·二
貝粉	三%	三—三·三
食鹽	〇·五%	〇·五—一·〇
總計	一〇〇%	一〇〇

另加抗生素補助飼料〇·三—〇·五%，魚肝油〇·五%，青菜或青飼料三〇%以上（即三〇—三三公分），家禽人工授精設簡單，各養鷄場多有使用，可前往參觀即知，現尚無設班傳授者。（周光宇）

長岡交配番茄抗病力强

【問】：（一）長岡交配種，赤福一號，與福壽是有什麼特性區別。（二）上陳品種，可否在夏季栽培，對氣候的抵抗力如何，對產量是不是會受影響？（三）如果在八月栽培，要提早幾日播種，比較適當。（四）在番茄開花期，對二，四—D除草劑的處理，是要加幾倍液，要怎樣做法。（雲林縣莿桐鄉廖朝圳）

【答】：（一）長岡交配赤福一號番茄，是早熟品種，果實扁球型，一果重量，約一五〇公分左右，色呈濃紅色，結果多。其他尚有長岡赤福三號，乃大型赤福等品種，果形均比一號大。長岡交配福壽番茄，有大型福壽，及新福壽等二品種，前者成熟期較晚，果實高球形，一果約二五〇公分左右，但果形大小不甚整齊；後者成熟期較早，果實圓球形，一果重量約二五〇至三〇〇公分，



請全省獸醫師養猪養鷄業者注意！

猪、鷄蟲藥之王—阿司卡利肯（アスカリケン）

（內藥登字第一四六四號）

「適應症」猪、鷄之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症

公認最安全最有效最便宜

①效力强大—殺蟲之力量百分之九十五以上。比任何種驅蟲藥超高。成蟲、蟲卵均死滅絕無副作用。

②用法簡單—投藥前不須絕食，服後不須使用瀉藥洗腸。

③價格最廉—猪一頭一元，成鷄一隻僅五分代價可獲得數倍利益。



日本東芝製藥株式會社榮譽出品

臺灣總代理　臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司

臺北市信義路二段一二〇號