






微病粉白類瓜



蟲成



蟲幼和蟲成的蟲根切

「可濕性粉劑及「蛋白質水解物」四〇〇倍稀釋液

⑥茄子、辣椒害蟲防治法與番茄害蟲同。

一次，直至採收完畢前一星期為止。

④番茄害蟲參照葉菜類害蟲防治法進行之，但開花結果後，改用五〇%「馬拉松」乳劑加水五〇〇倍，每七天噴藥一次。

⑤採收時如有害蟲發生每三至七天噴藥一次，施藥時間，最好在採收後立即噴射。

①豇豆、四季豆（敏豆）、皇帝豆等害蟲，於豇苗出土後七天，開始噴射二五% DDT 乳劑五〇倍或一〇% BHC 乳劑一、〇〇〇倍稀釋液，以後每七天噴藥一次。

②結莢後改用五〇%「馬拉松」乳劑五〇〇倍或三·五%魚藤精乳劑二五〇—一五〇〇倍稀釋液，每七天噴藥一次。

③開始採收時，如有蟲害發生，每三—七天噴藥一次，施藥時間，最好在採收後立即噴射。

·本刊啓事·

本刊十一卷十三—廿四期合訂本已經出版，每冊訂費新臺幣二十元，匯款訂購時請註明「十一卷下冊合訂本訂費」。

莢果類害蟲

蔬菜

用藥

注意

安全

——信學障——

應用低毒性農藥來防治蔬菜病蟲害的問題，已經可以說是老生常談了。三年前，正當農藥剛普遍地應用在防治農作物病蟲害的時候，由於食用蔬菜所發生意外不幸的事件，曾在輿論界引起一場風波。從那時起，對食用蔬菜無不存有戒心，各界對這個問題也特別重視；政府方面對蔬菜用藥的安全措施，也三番五次地叮嚀生產者，希望能夠保障國民健康與生命的安全。

蔬菜類中，除了部份利用它的根、莖、果莢外，大部份是食用它的葉子，這些佔有廣大面積的葉子，最容易接觸到農藥。又因為生長期間比其他糧食果樹短促，農藥的毒性還沒有完全分解以前，就達到可以使用的程度。因此防治蔬菜病蟲害，千萬不要用劇毒性農藥。

也許有部份農友對低毒性農藥的效力會懷疑，到底這些低毒性農藥能不能夠防治蔬菜的病蟲害？它的效果是不是和劇毒農藥一樣？根據試驗研究機關經過兩年來觀察結果，效果毫無二致。既然是這樣，我們又何必用牛刀來殺雞？

經過農業專家研究結果，規定防治蔬菜病蟲害應注意的事項有五點：

第一、蔬菜上絕對不要噴用「安特靈」。

第二、蔬菜收穫前四天內不要施用任何藥劑。

第三、收穫四天前——三星期中，可以噴「馬拉松」、「魚藤精」。

第四、蔬菜生育初期可噴用「馬拉松」、「魚藤精」、「DDT」或「BHC」。

第五、「愛特靈」和「地特靈」應該是專作為防治土壤害蟲之用。還有一點應該注意的，凡是買農藥，最好到當地鄉鎮農會去買，千萬不要使用偽藥或是未經政府登記許可的農藥。使用農藥一定要遵守政府機關所指導的使用方法和時間。

省政府農林廳自四十八年秋開始到現在，對這方面會不遺餘力地努力，如組織示範防治隊，召開訓練講習班，各地農友確也很熱心，到現在為止，全省已有一百零七個鄉鎮組織了示範防治隊。對於農藥的管理方面，政府已頒佈了「臺灣省農藥管理規則」，使農藥的製造、銷售與使用有了嚴格而統一的控制。

農友們一年之中胼手胝足，每期辛辛苦苦栽培蔬菜，一方面希望能夠增加生產，另一方面也希望能夠增進經濟上的收益，藉以提高生活水準。但是對農藥使用不得法，不但得不到利益，對人的健康和生命常有影響，甚至於發生生命的危險。反過來說如果蔬菜消費者對食用蔬菜有警戒心或是根本不敢食用，那麼還有什麼利益可言？農友們應該喚起公德心，互相勉勵，彼此勸解，通力合作，確保蔬菜用藥的安全！