


至於治療，需用特效藥「阿卡頗靈」、「皮利葛」、「巴必散」或「意斯拉敏」方為有效。

此時如能注射大量生理食鹽水或葡萄糖液，效果可能更好。
施行過預防接種或感染發病後經治療恢復健康的牛，以後都不會再感染此病。
為了保障酪農的利益，省農會已透過縣市

農會勸導酪農們將乳牛參加家畜保險。另一方面，政府在每年春秋兩季，也派人到可能發生此病的地區施行檢查。

又法令規定，發現本病的獸醫師，必須報告縣市政府，再由縣市政府層報農林廳作緊急處理。因此，農林廳經常備有少量特效藥，以防萬一。希望酪農們多多與政府合作，撲滅這一種嚴重的牛病。



預防家畜的「異嗜症」！

李培元

家畜好舐舍壁、砂土、喜食污穢的糞草，甚至自己生產的胎兒，對於正常的飼料反而不感興趣；這就是本文要介紹的家畜「異嗜症」。家畜發生「異嗜症」的原因很多，病型也有多種，治療時需自多方面下手。

家畜的「異嗜症」，常發生於一定的區域，主要見於牛及山羊，尤其多發生於妊娠母牛、泌乳母牛及新斷乳的小牛，有時也見於羊及家禽，小豬則很少發生。冬季舍飼的動物發病較多。家畜發生「異嗜症」的原因很多，如飼料內含有的食鹽不足，多吃富於磷酸的飼料穀類、麩皮及米糠等，或飼料中所含鉀量太多，促進食鹽排出而致食鹽不足等，都可能引發本症。又如飼料內鈣質缺乏，為家畜佝僂病及骨軟病的前驅症狀。其他如維他命缺乏，也會引起「異嗜症」。

家畜「異嗜症」症狀型式很多，分述之：


(1) 舐病型 家畜好舐舍壁、砂土、石灰、人的衣服，吃食污穢的糞草，給正常的飼料反而不喜食，漸致瘦弱、貧血，重症者發熱，反芻泌乳均減少，流產。

(2) 食毛型 多發於冬季的羊和家禽，小羊舐食母羊或其他羊的毛，如吞下多量羊毛則引起消化不良、胃腸炎。家禽最初啄食自己的毛，次及友禽；有時啄傷友禽頭部以至死亡。

(3) 食胎兒型 母豬分娩後，嗜食胎兒或胎衣。多因飼料配合不當，多磷缺鉀而發生。有時咬傷小豬尾端或耳翼。

異嗜症的治療，可自多方面進行。如變更飼養法，放牧，改變飼料，在飼料中添加鈣類，注意飼料中礦物質鈣與磷的配合比例，都是可行的方法。


又如補充礦物質食鹽、重碳酸鈉、磷酸鈉、石灰水和銅鐵鋅等鹽類，或維他命、青草、良質乾草及酵母等，也很有效。小羊生後三週，須與母羊隔離，於哺乳時再移近母羊。此外還可延請獸醫師給藥治療。



，(免很)死呆真市問枝木
，紀年(的)今甯來伊將人二
，(待逆)治甯來伊將人二
。死小羊(得打)甲拍常時



，四十年(至)甲養真阿
，去賣伊將就枝木
，女枝做(戶妓)問花去賣
。時 時 不客接日



，死(要)卜想若痛真阿
，伊救會女婦(得幸)或嘉生父
，去回(帶)魚母生父
。天謝成楚若免