



竹綠洋南的畔溪水濁集投南

竹變和南洋綠竹 ——適合採筍栽培 的兩種菜竹——

· 江 濤 ·



變竹的近附公頭石頭社化彰

農復會森林組和林業試驗所的技術人員，發現本省兩種適合採筍栽培的竹種——「竹變」和「南洋綠竹」，頗有繁殖推廣的價值。因為栽培的目的是採筍作為蔬菜，所以稱為「菜竹」。

本年度已開始委託斗六鎮雲林縣經濟農場和林試所六龜金雞納試驗場，用「分採」和「扦插」方法繁殖這兩種新竹。初次繁殖，每處約一千株。這一批繁殖的竹苗，準備下年度建立母竹林，作為竹苗的來源。兩年以後可以大量推廣。

竹 變

「竹變」又名「麻竹男」或者「竹男」，據林試所林維治按正說：應該屬於「吊絲球竹」的一變種，與「大頭甜竹」極為相似。「竹變」在彰化縣社頭石頭公及雲林縣古坑鄉發現，形態上的特徵如下：

幹部：（竹竿）竹幹竹材肥厚，尤其是接近基部和竹枝部分。高度可達十五公尺，胸高直徑十七公分（周圍約五十一公分），大小與優良麻竹竹幹不相上下。但是經過不斷的採筍，竹幹的尺寸就會退化，高度約五到七公尺，直徑約十公分（周圍約三十一公分）。竹幹基部的竹枝有小枝退化成為小刺的。

竹葉：葉部和麻竹完全相同。

竹箨：「箨片」端直極與麻竹相似；「箨舌」具有鋸齒形，與麻竹極相近；「箨耳」

不十分顯著，外形與麻竹相似，整個竹箨都具有麻竹的外形特徵。

就外形上看，「竹變」是屬於具有麻竹與刺竹的共同特徵，我們以大膽的假設：「竹變」是麻竹與刺竹天然的雜交品種。據社頭石頭公附近農友說：「竹變」產筍時期是四月到十月，比較麻竹採筍期為早，竹筍味道也極鮮美。在採筍和竹林兩方面看「竹變」，都屬於最優良的菜竹，值得大量推廣。

南洋綠竹

「南洋綠竹」在南投縣集集附近，嘉義縣中埔鄉和梅東村三處發現，梅東村農友稱它為「四季竹」。按它的外形，應該屬於「綠竹」同一「屬」，據農友們的記憶，這種竹類在本省栽培的歷史不長，大約十餘年。可能係第二次世界大戰期中，日人自粵、桂海南島或東南亞引入，所以稱為「南洋綠竹」。

「南洋綠竹」竹幹高約十公尺至十二公尺，胸直徑約十公分（周圍約卅一公分）；節與節間的長度是三十到五十公分；竹幹端直呈深綠色。採筍期為三月至十月，竹筍據說最

為鮮美。竹材比較鬆軟，是優良的紙漿原料，編織與製造竹器都十分適宜；不過未來的發展，應該着重在採筍上。

美國營林公司 養樹保木人員

美國有一千三百種林木，森林病蟲害有三千種之多，對這些林木的保護，民營公司已負起了重大的責任。它們舉辦訓練班，造就林業人才，訓練他們爬樹和修剪枯枝等技術，然後派到各林區去。這些經過訓練的人，每月可得到四百多美元的薪水。

但這些人只是森林保護的第一線，在他們之後還有許多科學家在實驗室裡孜孜不倦的研究。醫治樹木的病和為人治病一樣，有時要「吃藥」，有時則須打針。

因為工業的發達，許多美國人都遠離工業區到林地去尋找住處，這種趨勢對林業是很大的威脅。美國的民營林業公司，正在選育各種適合美化環境用的樹木品種，希望將來的工業區都能變成花園一樣，人們就再也不用遠避工廠進入林地了。