


柑桔病害多

防治應適時



【問】：(一) 附寄「晚霜夏」病果是瘡痂病或潰瘍病，其病徵如何鑑別，防治法如何，敬請惠予賜示。(二) 蘇澳縣大埔鄉會館。

【答】：(一) 附寄病果一種，敬祈鑑定後惠予指導防治方法。(宜關大同國校林東山)

(二) 奉寄柑桔瘡痂病一種，敬祈鑑定後惠予指導防治方法。此病為害甚重，應用何藥防治，尤其是葉背有白色之徵的，為害較嚴重。

防治瘡痂之黑星病，除用波爾多液，此外是否可用瑞士出品之「好寶粉」代替嗎？去年用過之夏油，今年是否可應用？不知是否會變質？對過夏油，要經過多久才可再射施第二次？(彰化縣永靖鄉盧文閣)

(四) 我的柑桔，部份樹枝發生有白點，然後皮部腐爛，落葉而枯，此種病應如何防治？茲付標本，特請鑑定，並指示是病何病？(楊清樓)

(五) 柑桔地衣類，應施用何種藥劑防治？(臺中縣石岡鄉張福乾)

(六) 我所種的柑桔，枝葉發現許多白色的粉蟲，葉色呈黑並捲起，今附上標本，請鑑定這種現象，是屬於何種病害？應如何防治？(高雄三民區江秀雄)

【答】：(一) 照樣本看是柑桔潰瘍病，防治法：①於六至九月間，每月各撒佈一次

四年式石灰波爾多液。②尤其颱風時節，應注意藥劑撒佈。③注意清潔葉面的驅除可用馬拉松乳劑。(劉康鑑)

(二) 據樣本看是柑桔瘡痂病，防治法應注意：①多雨時地面敷草，以免病菌逸散在地上。②剪除病枝。③多雨時節撒佈四年式石灰波爾多液。④注意排水。(劉康鑑)

(三) ①柑桔煤病。②柑桔粉介殼蟲。用五日「馬拉松」乳劑加水八百倍防治之。③介殼蟲類及粉介殼蟲，就可減少煤病繁殖。④防治黑星病，用波爾多液加大生七八藥害，可否與大生七八混合，而藥效如何無試驗資料。(劉康鑑)

(四) 根據標本鑑定結果，當是柑桔赤衣病，防治應注意：①除去被害部並燒毀。②不在陰濕地栽植。③適度剪定，注意透光及通風。④雨季撒佈三十四年式石灰波爾多液。(劉康鑑)

(五) 柑桔地衣到用「松脂合劑」防治之。(劉康鑑)

(六) 所附標本為瘡痂病的脫皮，防治此蟲可於晚間開始抽出時，撒佈二%益加津(伊加丁)八百倍，或二五%米賜多愛一千倍，十天後再噴一次，可免其害。(王進生)

讀者服務部小啓

余福三 余得萬 羅健鵬 謝義亭  
蔡勇吉 劉水生 楊順全 蔡真奇  
楊文時 王訓 廖維清 鄧利益  
劉化之 張維嶽 王覺非 鍾慶國  
福南行 葉葉鄉農會。

以上各位農友的問題，已送請專家解答，請等候本社的回信。

義務解答栽培白木耳銀耳失敗原因

因 鷄鵝型白木耳下種六十至九十天後如尚未發菌則為失敗，失敗者請將栽培者經驗，詳細代為解答，並贈送菌作一食用品(菇)人工栽培法一冊。

耳斤耳等種菌 敝場服務歷史最久近添置新式設備多種日產千瓶以上，由服務，栽培附取付郵即寄，顧客另贈栽培手冊，備有全省可數之塑膠玻璃栽培場，歡迎參觀指教。臺中縣霧峰鄉坑口村養菇場陳發敬啓

大肥 嚙

抗生素綜合維他命礦質補助飼料

爾料店，農會均售



促進產卵 預防疾病

益源製葯所 台北市羅斯福路三段二七二號

無毛木耳(川耳)	乾	無毛木耳	一臺斤	42元
	品	有毛木耳	一臺斤	92元
		白木耳	一兩	100元

您想種殖獲利最高的木耳嗎？請選購本場最新培養之無毛木耳(川耳)種。(本場備有標本，及瓶內發牛木耳之盛況，歡迎參觀)

木耳(有毛木耳)

由於產品價格太低，今後種殖將可能較無利可圖。本場只有少量備供供應

白木耳

種白木耳，您感到失望嗎？注意：別被魚目混珠的假種菌騙了。本場特製白木耳種菌經特殊科學處理後均能於瓶內發生多量白木耳子實體，以供參觀選購。本場更有種殖成功之紀錄可供參閱。

草 菇

本場備有大型草菇種菌供應可使你的產量大大的增高。

經銷處 桃園縣中壢延平路後段五〇號劉鳳鳴 鹿耳門路 號新豐行 宜都市 路 號新豐行 連絡處：臺北市衡陽街33號 黃阿福 場 址：臺北縣土城鄉大安村二一號

厚生食品農園菌種場

洋香草 菇 無毛木耳(川耳) 白木耳 大量供應(農林局(審查合格種菌場) 本場為 五〇年度，臺北、中壢、新屋、基隆及其他地區農友們普遍採用本場特製之優良洋菇種菌培養洋菇。獲得全省中最大的豐收，本場今年又再度擴大設備大量供應，願為大眾盡最大的熱成服務。(種木耳的季節到了，本場備有各種優良的木耳種耳。)