


柑桔病害多

防治應適時



[問]：（一）附生晚夏病果是瘡病或潰爛病，其病徵如何鑑別，防治法如何，敬請惠示。

。（新竹大埔鄉會熊徵）

[問]：（二）奉寄柑橘標本一種，敬祈鑑定後恩予指教，治療害方法。（宜蘭大同國校林東山）

[答]：（三）附上柑橘及柳橙葉，請判斷是否患病為害？應用何藥防治，尤其是葉背面有白色之斑，為害較嚴重。

[問]：（四）我的柑桔，部份樹枝發生有白點，然後皮部腐爛，落葉而枯枝，此種病應如何防治？茲付標本，特請鑑定，並指示是繩。〔楊清標〕

[答]：（五）柑桔地衣類，應施用何種藥劑防治？〔臺中縣石岡鄉張福良〕

[問]：（六）我所種的柑桔，枝葉發現許多白色的粉蟲，葉色呈黑並捲起，今附上標本，請鑑定這種現象，是屬於何種病害？應如何防治？〔高雄三民區江秀雄〕

[答]：（一）照樣本看是柑桔病害，外級品另說。臺中縣霧峰鄉坑口村農場本公司農場，顧客另贈扶助，農場貯量有起始，內管事利在案不日可供應，生產品高價收每臺幣200、150、100元。

[答]：（二）於六至九月間，每月各施佈一次，請各農友。

迎服務，栽植特開付雨即寄，顧客另贈扶助，農場貯量有起始，內管事利在案不日可供應，生產品高價收每臺幣200、150、100元。

耳斤耳等種菌

因義務解答答栽培白木耳銀耳失敗原因

供應平地品種香姑木

四年式石灰波爾多液。(2)尤其颱風時節，應拉松乳劑。(劉康鑑)

應注意：(1)多雨時地面乾草，以免病菌孢散在地上。(2)剪除禿枝。(3)多雨時節撒佈四年式石灰波爾多液。(4)注意排水。(劉康鑑)

(三) ①柑桔煤病。(2)柑桔粉介殼蟲，介殼蟲類及蚜蟲驅除了，就可減少煤病繁植。(4)防治黑星病，用波爾多液加大生七八倍，好密霧為飼料，對黑星病本身有效，但有藥害，可否與大生七八混合，而藥效如何無試驗資料。(劉康鑑)

(四) 根據標本鑑定結果，當是柑桔衣病，防治應注意：(1)除去被害部並燒毀。(2)不在陰濕地栽植。(3)適度剪定，注意透光及通風。(4)雨季撒佈三年式石灰波爾多液。(劉康鑑)

(五) 柑桔地衣可用「松脂合劑」防治之。(劉康鑑)

(六) 所附標本為鱗蚧的脫皮，防治此蟲可於嫩葉開始伸長時，噴布20%益加津液(伊加丁)八百倍，或二千克米陽多愛一千倍，十天後再噴一次。可免其害。(王進生)

· 讀者服務部小啓 ·

余得萬 羅健騷 謝義亭

余得萬 羅健騷 謝義亭
蔡勇吉

劉水生 楊順全

劉水生 楊順全
王訓

廖維清

廖維清
張維嶽

王覺非

王覺非
燕巢鄉農會

劉化之

劉化之
福南行

劉化之
燕巢鄉農會

王覺非
王覺非
鍾慶國

藥料店，農會均備



促進產卵預防疾病

益源製藥所

台北市羅斯福路三段二七二號

無毛木耳(川耳)

您想錯植最貴的木耳嗎？請進購本場最新培養之無毛木耳(川耳)種。(本場備有標本，及觀內發生木耳之盛況，請到來參觀)。

乾品

無毛木耳
一臺斤 42元
一臺斤 92元
一兩 100元

洋香草

菇無毛木耳(川耳)

白木耳 大量供應(農林廳審查合格種菌場)

木耳(有毛木耳)

由於產品價格太低，今後種植將可能無利可圖。本場只有少量供應。

白木耳

白耳

種白木耳，您感到失望嗎？注意：別製被魚目混珠的假種菌騙了。本場能供應白木耳種菌經特殊科學處理後，可供參觀。瓶內發生多量白木耳子實體，供參觀。

草菇

本場備有大型草菇種菌，可供你的產量大大的增高。

經銷處：劉明鳳、黎覺、胡德昌、新店、

桃園縣中壢延平路後段五、三、一號

桃園縣中壢新屋鄉新屋村一號

宜蘭市通路處：臺北市衡陽街33號

場址：臺北縣土城鄉大安村二號

厚生種菌園農食品場