

# 菜蔬等瓜西·瓜胡·瓜南 點要理管培栽的間月五

生進王

## 南瓜

南瓜易因施肥過多瓜莖葉片過茂而引起落果，尤以生長初期氮肥過多時落果特多，所以應該注意追肥的數量。

第一果開始發育後，每十公畝地施用尿素三至四公斤，氯化鉀二至三公斤，並須與土壤混合均勻，以免傷根。

栽培株數少時，因花粉較少，宜用人工授粉。授粉時間愈早愈好，最好在上午五時半至七時半，花瓣尚未開始萎凋以前舉行。在攝氏二十三至二十七度的氣溫下用人工授粉，能將着果率提高至七十五%左右。

授粉時宜行異株授粉，因異株授粉比同株授粉的着果率高。授粉方法是將雄花花粉輕輕均勻地擦在雌花的柱頭。

根據天氣預測或自己的經驗，在將下雨的前一天下午至六時，用繩形針或膠帶夾住雌雄花的花瓣，使花瓣不能展開，以免花粉被雨水淋濕。

## 胡瓜

本月間，本地種青皮胡瓜正在收穫盛期，養分消耗很大，露菌病、白粉病也發生得多。

為預防病害，宜每隔七天噴射「大生七八」四百倍液一次。如果使用「大生二二」時，不可將濃度提高至二百五十倍以上。白粉病宜噴射「可利生」八百倍液防治。

為補充養分，宜在每次收穫後施用尿素稀釋液（每十公畝二公斤左右）於畦中央，但應避免澆在葉面以免傷害。

土壤過乾時，易於產生苦味瓜和畸形瓜，所以應該注意澆水。「臺中目瓜」比北部的「內湖種」和「頂雙溪種」容易產生苦味瓜，所以應該特別注意。從本月起可以種植「立秋種」和「四葉種」。

這兩個品種都不耐移植，並需要較多的水分，所以除澆水外，並需分施尿素和氯化鉀，以促進生育。每十公畝用量約為尿素二公斤，氯化鉀一公斤，繼續四至五次。

到了本葉三至四枚時，宜用剪刀間拔部分瓜株，每穴留一至二株即可。間拔後立支柱；採用合掌式較能抗風。

立支柱時，瓜株會受輕度的擦傷，所以應立即噴射「大生七八」四百倍液，預防病菌侵入。

雌花開放時，氣溫正適於瓜實蠅的發生，所以宜用水解性蛋白質加二五%「馬拉松」可濕性粉劑四百倍液噴射開場誘殺。


守瓜發生多時，應在發生初期每隔十天噴射「賽文」一千倍液一次。

胡瓜最好自己留種，選優良母株（不帶苦味，雌花着生早且多者）行異株交配為宜。

## 西瓜

今年二月下旬至三月中旬在新竹以北地區播種的西瓜，多因受到霜害而在三月下旬至四月上旬補植。補播的苗株，應提早第一次追肥，最好在本葉二至三枚時施用。第二次應在本葉五至六枚時舉行。瓜莖側枝開始伸長時行第三次追肥，並在全畦面上覆蓋稻草。第一雌花應早期摘除。

病蟲害的防治工作，應徹底及時舉行。發育不良株容易產生畸形果，如發現畸形果時，應早期摘除。假如需要人工授粉，宜在上午五時至六時間舉行。



圖一：用翅針夾住南瓜花雌雄

## 冬瓜


冬瓜本月宜行第三次追肥。通常在第一果着果後五至六天時施用尿素或腐熟豬糞尿（每十公畝約二十擔）。施肥後宜行培土。整枝時，以採用母蔓一枝及子蔓三枝之四枝整枝法為宜，其他的子蔓應於發生初期摘除。

近年來，蔓割病和青枯病頗為猖獗，應注意排水，並避免深度中耕，以預防發病。在拔去病株後，宜用水銀劑八百倍液消毒土壤。使用「收錄生」處理土壤，也可以減少該病等之發生；預防時使用二千倍液灌注根部周圍。會發生過該病的土地，早地宜行五年輪作，水田宜行一至二年輪作。

經常噴射「大生七八」四百倍液，可預防炭疽病發生，但在雌花着生時，不要使用強烈的霧滴直接噴射雌花，以免落果。

## 茄子

春季栽培的茄子，在本月中已達生育和生產的盛期。因為開花着果多的關係，養分消耗很多，所以必須補給氮素和少量的鉀，才能獲得良好的成果。在本月中，應經常施用尿素稀釋液，用稻草覆蓋畦面，舉行動度的灌溉，並將壞枝剪除。



圖二：冬瓜、茄子、菜蔬等應速噴果花。在本月中，應經常施用尿素稀釋液，用稻草覆蓋畦面，舉行動度的灌溉，並將壞枝剪除。

## 徵稿

本刊農友經驗欄（請參看廿七頁）歡迎各地農友投稿，內容以實際經驗或心得為限，最好附寄有關照片或插圖。