

立方公分反復靜脈注射數次。

碘缺乏症

本病多發生在剛出生的仔豬，主因飼料或飲水中缺乏碘質所致，尤其是在受孕的母豬。

病狀 仔豬出生時即無毛，所以有一「無毛豬」之稱；如有毛者，亦僅疏薄而成一塊塊的毛。有的因為甲狀腺腫大，喉部常隆起。

防治 母豬受孕期間，在飼料中加入碘質，可完全防止本病發生。缺乏碘質的地區，可在食鹽中加入少量的碘化物（用食鹽三千份加碘化鉀一份混合），或用市售的碘化食鹽混在飼料中喂飼。

乳豬貧血症

患乳豬貧血症的豬，多為生後三至六週的乳豬，特徵為血液中的紅血球和血紅素大量減少。

病因主為飼料中缺少鐵與銅兩種成分，如，

長久將仔豬飼養於水泥地、磚地的豬舍中，因不能充分獲得鐵與銅的補給，很容易發生本病。

病狀 患本病的仔豬，在三週左右精神開始萎靡，軟弱，稍微動作即感呼吸困難。橫隔膜有痙攣性的收縮，以後皮膚發生皺紋，粘膜呈蒼白，削瘦，體重減輕。但也有在肥胖情況下突然死亡者。

剖檢屍體時，常發現血液和一切組織都呈現淡色，心臟擴大。有時發生肝臟炎，肝的病變明顯，肝表面呈淡黃色斑紋。

防治 在舍內放置土壤，任仔豬採食，可防止乳豬貧血症的發生。據臺灣種畜場歷次試驗結果，飼喂消毒土壤，可獲得顯著的預防效果，且較為經濟有利。

此外，對出生三至二十一天的仔豬注射鐵菌葡萄聚糖（Iron-dextran），也可以防止本病的發生。

又最近臺灣氣胺公司銷售的一種鐵劑注射藥名「Pig Dex」，對仔豬貧血症的預防與治療，也有良好的效果。（趙法清）

怎樣 救治 農藥中毒？

徵求醫師指導員農友們的經驗談

農藥可以防治作物病蟲害，給農友們帶來更多的收益，但是如果處理不當，使用的人或作物的食用人就會發生中毒，甚或死亡。近年來，本省的農友們使用農藥，多能遵守規定，小心使用，但是偶而還有中毒死亡等不幸情事發生。

省政府農林廳，為了進一步喚起農友們的警覺，預定在本年度農藥使用最多的時期（暫定七月間），會同各有關單位，舉行防止

農藥中毒擴大宣傳。

為配合該項宣傳工作，本刊特徵求各地醫師、指導員和農友們對「救治農藥中毒」和「防止農藥中毒」的經驗談。來稿請在本月底以前寄出。



市街來哥柳日一
(意注)字細無路行為因
死撞來車汽乎伊
屍埋(可)通鏡無保無



桃初願飽食哥柳
無(產財)仗家(玩賭)跋願開願
保無也蓄儲無也
何奈無活生家一



哥柳叫友農位一
驗風真人做哥柳
(要玩)桃初願飽食(天整)日歸
好險保蓄儲信不