




Dipterex

S.P. 80



請認明拜耳商標為品質高超信用可靠之標記

作物類	適用蟲名	稀釋倍數	每公頃使用法	備註
水稻、玉米、甘蔗、水稻、棉花	水稻螟蟲、玉米螟蟲、甘蔗螟蟲	500—800倍	1000—1500公升	每隔七天噴射一次
	水稻飛蟲、浮塵子、棉花浮子	500—1000倍		10天
	松毛蟲、松綠葉蜂	1000倍		
茶樹類	茶蠶、茶避債蛾、茶捲葉蟲	500—1000倍		
	切根蟲、小地蠶	地特松250g+米糠10公升+5—8kg清水混合均勻後於傍晚散佈於莖下每公頃地特松1kg		
葉菜類 害蟲	小白菜、芥菜、菠菜、窩苣、蒿、蒿、葱、韭菜、芹菜、芫荽等之青蟲、斜紋夜蛾、鱗翅目、幼蟲、黃條葉蚤、小猿葉蟲。	500—1000倍		每7天噴射一次
果菜類 害蟲	黃瓜、南瓜、絲瓜、瓠子、甜瓜、西瓜	出苗後1:000倍開花結果後1:400水解蛋白質稀液或1:100糖稀釋之1:000倍本劑稀液		每7天噴射一次
蕃茄害蟲	蕃茄害蟲、辣椒害蟲之防治與葉菜類害蟲相同	500—1000倍		每7天噴射一次
辣椒害蟲	同上開花結果後之蕃茄夜蛾	500倍		
莢果類 害蟲	豇豆、四季豆（敏豆）皇帝豆	500—1000倍		真葉生出時起每7天噴射一次
柑桔	①柑桔木虱、角肩椿象	500—1000倍		每5—7天噴射一次
	②雌性果	甲基丁油內加入3%本劑混合均勻置玻璃誘殺器內		7—10天調查誘殺數量決定雌性果蠅誘殺時期
	③雌性果蠅角肩椿象、蚜蟲軟傳害蟲	1:400之水解蛋白質稀液或1:100之糖水溶解本劑稀釋至1000倍（即砂糖或紅糖100公克或水解蛋白質25公克加本劑10公克及水稀釋成10公升溶液）		柑桔成熟時之雌性果蠅誘殺數量急增時每隔5—7天連續噴射3—4次
菸草	桃蚜、青蟲、蓮紋夜盜、鱗翅目幼蟲	500—1000倍 或以防此切根蟲方法配製毒餌防治		

臺灣總代理：中德貿易公司

地址：臺北市博愛路98號