

粒結核一。有的在肋膜面形成很多真珠狀物黏着，叫做「真珠病」；這是最厲害的一種。

預防方法三種

預防乳牛「結核病」的第一要點是購買健康而未感染結核病的乳牛。

其次是牛舍要設計得妥當；最好是坐北朝南，通風良好，採光充足。

第三是常常將牛隻放出屋外運動，並避免與結核病牛或病人接觸。

病牛須即撲殺

機關每年都要舉行結核病檢查兩次，在乳牛尾部皮內注射結核菌素；如果是健康牛，注射部位不會發生任何變化；如果是病牛，則

不論病之輕重，經過二至三日後注射部位就紅腫硬結至拇指大以上。

對於發生反應的乳牛，政府都發給補償金，收購撲殺，以保護本省的乳牛事業，並維護公共衛生。

人的結核病，要花很多金錢和很多時間來醫治。乳牛的結核病，也是一樣的。

一頭乳牛的價格，通常在二萬元左右，所以要用大量的藥物和很長的時間來治療，是划不來的，因此從來沒有人嘗試過治療，這一點和別的疾病不同。

前些時有一個牧場，因為病牛撲殺遲延，結果越傳越多，招致了慘重的損失；這也是值得我們去注意參考的事情。

趕緊防治鐘麻苗期病害！

杜金池

今年的鐘麻，大多已經順利播種，但因部份農友疏忽了播種前的種子消毒工作，現在各地鐘麻園都發生了嚴重病害，麻農們焦急異常。現在介紹鐘麻苗期主要病害，及防治方法，以供各位參考。

鐘麻苗期有那些病害？

鐘麻苗期最主要的病害有兩種：

(一) 炭疽病 本年度各地鐘麻幼苗病害，以本病發生最多，為害最重。被害幼苗，靠近地面的莖部發生淡褐色或黑褐色濕潤狀病斑，並逐漸擴大，終由該部挫折，倒伏地面，萎凋死亡。本病也侵害幼葉，在葉面產生圓形黑褐色病斑，後來病斑中央部變成灰色。並可侵害幼苗心芽部分，使心芽變成黑褐色，萎凋死亡。

(二) 腰折病 本病為苗期常見病害。在氣溫異常，播種後或發芽後，地溫突然降低，致幼苗生長緩慢時，最容易發生。被害幼苗，靠近地面的莖部，發生黑褐色病斑，病斑發生凹陷後，幼苗即倒伏枯死。


幼苗發病後怎樣處理？

幼苗病害發生後，應即採取下列三步驟防治：

- (一) 早期拔除病株，並淘汰不健全株，以抑制病害蔓延。
- (二) 注意排水，消除病害發生誘因。
- (三) 病害嚴重的麻田，噴酒「谷樂生」一千至一千五百倍液一至二次，可收防治效果。



· 記要衛生人做
· 氣清洗要着飲食
· 氣清洗要着肥菜生
· (公安) 志代無會了食



· 細要着第一人做
· 明分要着(刺)春食肉魚
· 冰要着(刺)春食肉魚
· 生衛不了食無后



· 奇好愛通無人做
· 魚怪食亂通無了食
· 魚怪食亂通無了食
· 死枉冤毒中食