

最新驚人的植物ホルモン劑已出現!!

純粹一植物生長綜合賀爾蒙劑一高單位

保證品質 一滴顯效

快豐收液劑

葉面撒布劑

中央標準局註冊商標
第12718號

AUXIN — H61

快豐收之特點

- ①增加作物之生長果實之速度並促進成熟期
- ②防止花落果改良品質增加產量提早收成
- ③增加發芽率促進活著力
- ④抵抗病蟲害並防止稻熱病等發生
- ⑤增加產量二成至六成
- ⑥快豐收品質絕對與他貨大不相同

製造廠 神農化工廠出品
廠址 南投縣名間鄉濁水村39號



【問】：本地第一期稻作，水量常感不足。今想自鑿水井，以解本身及其他農友之苦。已有了地下水抽取設備，可否免繳水費，可不靠農田水利會之灌溉，可否免繳水費

自設水井灌溉 仍需繳納水費

【答】：①西藥生石灰混合肥料，原則上不是良好辦法，分別為宜。
②插秧後四十五天，施用過磷酸鈣效果頗少，鉀尚可施用。(金慶東)



不宜與肥料混合

【問】：水稻插秧後四十五天(第二次除草時)，為預防稻熱病，並節省人工起見，擬將西藥生石灰和過磷酸鈣與氯化鉀(加里)混合後散布，是否可以？(雲林縣西螺鎮維多)

【答】：①西藥生石灰混合肥料，原則上不是良好辦法，分別為宜。
②插秧後四十五天，施用過磷酸鈣效果頗少，鉀尚可施用。(金慶東)

【答】：在魚塢的水稻，生育一定過好。你現在趕緊向農藥行買殺草劑(二、四—D)，用一、八〇〇倍液噴霧，即可抑制制生育。殺草劑一盒五〇公分，泡一、八〇〇倍液是九〇公升，可噴一分地。隔十五天再噴一次。並要注意稻熱病發生。(余慶東)



或減繳呢？(南投縣埔里鎮洪昭華)
【答】：在水利會灌溉區內自設水井灌溉，仍不能免繳水費。(水利局水政組)
媽娜露西欄仔栽培

【問】：媽娜露西欄仔可否於一期水稻後欄仔栽培？
①一分地需要多少種子？
②自播種至可移栽期須要幾天？(雲林縣立虎尾農校陳秋煌)

【答】：①蕃茄不耐熱，故作欄仔栽培時地不可有水。最好在第二期水稻收穫後，立即整地，後栽種。於水稻收穫前三天(水稻抽穗初期)播種百苗，就可在水稻收穫後定植。
②一分地所需種子量約二十五公克，若天氣不順宜播三〇—三七、五公克。
③媽娜露西欄仔育苗期間，與溫度有關係。在攝氏二十五度左右播種，約三十天左有就可定植。(王進生)

讀者服務部小啓

周文均 楊坤鎮 林乃群 張西
林育正 陳銀和 楊糖 徐包敬
張景興 蕭興鑾 詹進德 李朝東
楊鴻財 陳明龍

尿素

尿素肥效等於硫酸銨22倍
尿素中性連續使用保證無害

其他化學肥料
氯化銨 過磷酸鈣 硝酸銨 硫酸銨
成份保證 肥效宏大
台灣肥料股份有限公司
台北市南港路九十一號 電話：二五六一—四

嘉義 清河夏季優良種子

早生30天青粉葉包心白菜子	日本丸葉山東白菜(一條橋)	白粉色冬瓜
長岡一號甘藍菜子	日本半結球白菜子	美國大五寸人參
長岡交配福壽二號トマト	日本白體球白菜子	白木耳種菌
大號白腳菜葉子	紅仁白格二尺半長菜豆	清河改良白菜子
日本切葉白菜子	黑仁青格菜豆(紅帶尾)	早生58天花椰菜子
烏龍大號應菜子	八十天油菜子	嘉隆早生一號結球甘藍菜子
蘇魯種矮脚木瓜	青江白菜子	二
厚木耳種菌	黑仁豌豆子	早生扁甲芥菜子
40天長種馬耳乾菜頭子	想恩樹子	粗廣北蔥子
50天長種馬耳乾菜頭子	黃梨仔瓜子	早中生白葉白骨芹菜子
60天長種多瓜白菜頭子	ニエムロン子	早中生黃心白骨芹菜子
金瓜(南瓜)子	幼菜目豆子(菜豆)	白虎耳香菜子
其中30天包心白菜之栽培期間，由農曆二月下旬至七月止，第一期水稻區均可播種，其它各色種子及農藥，應有盡有，歡迎賜顧為荷。	七寸胡瓜子(免插枝)	赤菜包心芥菜子

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
割發儲金嘉字八〇〇三七號