

最新驚人的植物ホルモン劑已出現!!

純粹一植物生長綜合賀爾蒙劑一高單位

保證品質 一滴顯效

快豐收液劑

葉面撒布劑

中央標準局註冊商標
第12718號

AUXIN — H61

快豐收之特點

- ①增加作物之生長果實着花之速度並促進成熟期
- ②防止花落果改良品質增加產量提早收成
- ③增加發芽率促進活着力
- ④抵抗病蟲害並防止稻熱病等發生
- ⑤增加產量二成至六成
- ⑥快豐收品質絕對與他貨大不相同

製造廠 神農化工廠出品
廠址 南投縣名間鄉濁水村39號



【問】：本地第一期稻作期，水量常感不足。今想自鑿水井，以解本身及其他農友之苦。已有了地下水抽取設備，可不自備農田水利會之灌溉，可否免繳水費

自設水井灌溉 仍須繳納水費

【答】：①西藥生石灰混合肥料，原則上不是良好辦法，分別為宜。②插秧後四十五天，施用過磷酸鈣效果頗少，鉀尚可用。③農友



【問】：水稻插秧後四十五天(第二次除草時)，為預防稻熱病，並節省人工起見，擬將西藥生石灰和過磷酸鈣與氯化鉀(加里)混合後散布，是否

不宜與肥料混合

【答】：在魚塢的水稻，生育一定過好。你現在趕緊向農藥行買殺草劑(二·四·D)，用一、八〇〇倍液噴霧，即可能抑制生育。殺草劑一盒五〇公分，泡一、八〇〇倍液是九〇公升，可噴一分地。隔十五天再噴一次。並要注意稻熱病發生。(余慶東)

西藥生石灰

【問】：水田插秧後四十五天(第二次除草時)

或滅嫩呢？(南投縣埔里鎮洪昭華)
【答】：在水利會灌溉區內自設水井灌溉，仍不能免繳水費。(水利局水政組)
媽娜露西棚仔栽培



秋煌

【問】：①媽娜露西棚蕃茄可否於二期水田後棚仔栽培？②一分地需要多少種子？③自播種至可移栽期須要幾天？(雲林縣立虎尾農校陳秋煌)

【答】：①蕃茄不耐濕，故作棚仔栽培時地不可有水。最好在第二期水田收穫後，立即整地，後栽種。於水田收穫前三十天左右(水田抽穗初期)播種百苗，就可在水田收穫後定植。②一分地所需種子量約二十五公克，若天氣不順宜播三〇—三七·五公克。③媽娜露西蕃茄育苗期間，與溫度有關。在攝氏二十五度左右播種，約三十天左右就可定植。(王進生)

讀者服務部小啓

周文均 楊坤鎮 林乃群 張西
林育正 陳銀和 楊糖 徐包敬
張景興 蕭興鑾 詹進德 李朝東
楊鴻財 陳明龍

以上各位農友的問題，已送請專家解答，請等候本社的答覆。

嘉 清河夏季優良種子

- 早生30天青粉菜包心白菜子
- 長岡一號甘藍菜子
- 長岡交配福壽二號トマト
- 大白白菜子
- 日本切葉白菜子
- 烏龍大號應菜子
- 蘇魯種矮脚木瓜
- 厚木耳種
- 40天長種馬耳松菜頭子
- 50天大白松菜頭子
- 60天長種多頭白菜頭子
- 金瓜(青瓜)子
- 其中30天包心白菜之栽培期間，由農曆二月下旬至七月止，第一期水田區均可播種，其它各色種子及農藥，應有盡有，歡迎賜顧為荷。
- 日本丸葉山東白菜(一條橋)
- 日本半結球白菜子
- 日本青白體菜子
- 紅仁青格菜子(紅帶尾)
- 八十天油菜子
- 青江白菜子
- 黑仁豌豆子
- 想恩樹子
- 黃梨仔瓜子
- ニムロン子
- 幼菜目(豆)子(菜豆)
- 七寸胡瓜(免插枝)
- 白粉包心芥菜子
- 粗廣北蕪子
- 早中生白葉白骨芥菜子
- 早中生黃心白骨芥菜子
- 白鹿耳芥菜子
- 赤葉包心芥菜子
- 白粉包心芥菜子
- 美國大五寸人參
- 白木耳種
- 清河改良白菜子
- 早生58天花椰菜子
- 嘉隆早生一號結球甘藍菜子

清 河 種 子 行

嘉義市中正路四八二號
電話：三五八四號
割撥備金嘉字八〇〇三七號

尿 素

尿素肥效等於硫酸銨22倍
尿素中性連續使用保證無害

其他化學肥料

氯化銨 硫酸銨 硝酸銨 化成氣磷

成份保證 肥效宏大



台灣肥料股份有限公司

台北市新橋路九十一號 電話：二五六四一—四