

播廣業農省全

最新生節目時間表

說明：①今年不施行夏令時間，各節目仍照標準時間播出。②附有*者為客語節目；附有**者為部份客語節目；其餘為閩南語節目。

農好節目電臺週率時間								
村	臺中東臺灣	花蓮臺廣	高雄臺廣	臺南臺廣	嘉義臺廣	臺中臺廣	苗栗臺廣	公中司廣
八二〇	一一九〇	一四五〇	八九〇	一〇四〇	一一〇六〇	一一四〇	一一九〇	五九八〇〇
星期一十六，下午八時至三十分至七時半								
農務服村	之農友民	農蘭友陽	夜田話園	農早農的	農家樂	稻香村	稻一中農	稻二中農
八二〇	一一九〇	一一四〇	一一一〇	一一一〇	一一一〇	一一一〇	一一一〇	一一一〇
星期一十六，下午七時半至六時半，上午五時半至六時半，下午四時半至七時半								
農快家的	農快樂	農樂	農樂	農樂	農樂	農樂	農樂	農樂
七七〇	七七〇	七七〇	七七〇	七七〇	七七〇	七七〇	七七〇	七七〇
星期一十六，下午五時半至八時								

應各噴一次，尤其在二化螟蟲發生的地區，齊穗期的防治工作是很要緊的。使用「巴拉松」要特別小心，以免中毒。螟蟲幼蟲長大後，對藥劑抵抗性增強，不容易殺死，最要緊的是要把握適期，在幼蟲幼小時施藥防治。又稻紋枯病和螟蟲同時發生時，殺菌劑與殺蟲劑可混合施用。

稻飛蟲如發現成蟲或幼蟲密度增高，應撒佈一% BHC粉劑，每公頃四十至五十公斤。這樣可減少二期作受害的威脅。

黑尾浮塵子 BHC對黑尾浮塵子的防治效果不太理想，應施用一〇%D D T粉劑四十至五十公斤，或二十五%D D T乳劑五百倍或五十%「賽文」可濕性粉劑一千倍液，每公頃一千二百公升，畦間作受害的威脅。

於噴射「安特靈」、「巴拉松」、「依必安」、「速滅松」等防治螟蟲時可同時防治。各位農友們，為了確保本期水稻的豐收，請參考本文，隨時巡視田間，並接受各區農業改良場的指導，隨時施用可靠的農藥。

如能在同一地區，組織共同防治隊同時實施防治，效果可能更大。

蟲病的意注應期穗孕