


提高乳母羊受胎率

要知牠發情期長短



【問】：我飼養的一頭白乳羊，從初次發情第二天配種，未孕，後每隔四、五天發情一次，多次配種，均未受孕，不知是何原因？（雲林縣刺桐鄉陳清福）

【答】：要提高乳母羊受胎率，最主要的，要知道母羊的發情期長短。因為有的母羊，發情期僅有二、三小時；但發情長的有二、三天。發情期長的，在發情後第二天配種，可能受胎機會多，但短的要視情形，在牠能安定接受配種時行之。

凡母羊配種後不受孕，經廿天後再發情。來信說只有四、五天，很少見，最好請獸醫檢查。（林誠華）

防治梨樹赤星病



【問】：一、本人植有橫山大梨五十株，現在葉上發生病害有如星一樣（附上原病害照片），雖屢經噴射水銀劑混合馬拉松，仍未見效，且日甚嚴重，請問這是蟲害還是病害？

二、應該用何種農藥防治？（苗栗縣卓蘭鎮邱東雲）

【答】：寄來標本是梨赤星病。防治法：①降雨前用石灰硫黃合劑一—二度液撒布二、三次。②降雨前用四斗式石灰倍量，（即六一二式）波爾多液撒布，配製石灰波爾多液時，硫酸銅之半量，用硫酸亞鉛二—五克代替，可減輕藥害。

③「大生Z七八」三七·五克，加水十八公升噴布之。（朱啓魯）

柑園防風林

刺竹較理想

【問】：①柑園南北距離七十五公尺，各種觀音竹一排，以為防風林，是否合適？防風林之防風距離，為防風林之幾倍？

②柑園是否需灌漑？

③應種什麼綠肥？（臺中縣豐原鎮劉漢傑）

【答】：①觀音竹之樹形較矮，只適宜園內防風應用。柑桔園四圍，種植防風效果較大之刺竹為理想。南北七十五公尺柑桔園，除四圍防風林以外，園內另須種植東西方向三排之防風林。

②柑桔園須選擇地勢高，地下水低而排水良好之土地。地下水位高或易積水之土地，切勿選用為柑園。乾燥過度時，雖可利用灌漑水，但須即時排出，不得積水。

③種植柑桔園綠肥，現已在農林廳推廣中，栽培方法及種子等問題可向農林廳詢問。

④防風林之防風距離，雖隨地形而異，但一般在平地之防風距離，為防風林之六倍。（翁仁祿）

日本星家驅蟲劑

本省尙無現貨


【問】：驅蟲劑メタストロン，何處有出售？（臺中縣神岡鄉陳新丁）

【答】：メタストロン，是日本星家畜藥會社（東京都千代田區神田駿河臺一—六）之出品，有錠劑及針劑二種，本省現在可能無現貨，請函洽該社。（張聯欣）

讀者服務部小啓

黃榮木 葉明添 史雲亭 陳賢榮
陳永霖 張基修 連進興 梁繼權
蕭天龍 范大渝 陳兆祥


以上各位農友的問題，已送請專家解答，請等候本社的答覆。



H5型

久保田
フンム 機
サンポン機
久保田鉄工株式会社

以信用保證 品質超群
堅固耐用!!



LM型

好消息!!

耕耘機的**久保田**

榮譽出品各種防除機已經到臺了!

詳細規格如下:

農業機械的專家 **久保田**

	H5型動力噴霧機	LM型噴霧噴粉兩用機		H5型動力噴霧機	LM型噴霧噴粉兩用機
尺寸	長36.4 寬28.2 高35.4 (公分)	長46 寬53 高72.5 (公分)	最大吐水量	每分7~9公升(吸水量)	每分3公升
發動機	久保田 LK 50型 183cc 5 馬力	久保田 D-52型 1.4 (馬力)	到達距離		10公尺
藥液容量	無限	12公升	附屬品	一式 (包含工具)	一式 (包含工具)
			重量	38.7 公斤	18.5 公斤

臺灣總代理店 **益豐貿易股份有限公司** 臺北市南陽街84號
電話: 36865 · 33730

請向本公司或各地久保田耕耘機經銷處洽購