


## 注意

## 乳牛傳染性流產病



炎燃劉

乳牛傳染性流產菌病，是使乳牛發生流產的一種傳染病。我們飼養乳牛的主要目的，是要母牛生育小牛，並擠乳獲利。如果染患傳染性流產菌病，懷孕未足月即發生流產，不但不能獲得小牛，同時也不能擠得牛乳，損失是很大的。而且，這種病還能使管理人員感染，發生波狀熱（時發時退），所以從公共衛生上看，也是很值得注意的。

## 生殖器內有病菌

本病是由布氏桿菌感染所引起的。這種病菌，多存在於病牛的生殖器內（不論公牛母牛）或乳汁中，所以，病牛交配，最容易傳染。

又流產胎兒、胎衣或其他分泌物中，也有很多細菌，都是本病的傳染病源。因此處理排泄物時，必需非常小心，應行嚴密徹底消毒。

病菌可經由公牛與母牛的交配互相感染，公牛生殖器中有了病菌後，與健康母牛交配，則由此引起感染，傳到很大範圍去。人工授精用的精液，如果帶有病菌，也可能傳染本病。另一方面，飲食經病菌污染的水或飼料，也可

通過腸管感染。有時病菌又可引起發熱、食慾不振等症狀，而突然在懷孕六至八個月時（多在七個月時）發生流產。

流產前一至二天時外陰部腫脹，有時流出血樣粘液。流產胎兒通常是死的。娩出並不困難，但有時後產（胎衣等）停滯。這些裡面都有很多病菌。

流產後母牛常呈子宮內膜性漿液浸潤，胸腔和腹腔也膿塊。小腸呈出血性炎症。


## 預防工作最重要

預防本病的有效方法，第一，是不要購買有病的母牛，第二，就是不要用有病的種公牛交配母牛。

政府為發展酪農事業，每年都舉辦牛流產病檢驗工作，這項檢驗，需從牛頸部靜脈採取血液約十立方公分(CC)，送往試驗室作「凝集反應」及「補體結合反應」，如果檢出有病（我們稱為血清反應陽性），該牛最好淘汰掉，以免傳染到別的牛去。

一方面由國外進口乳牛時，海港檢疫所也施行同樣嚴密的檢查，認為沒有染病的，才准

迷信算命不應該 小顧圖



榮顯名親父階玉  
明開寶貴老人爲無  
能貪且賢無怨雖  
平公私



慎阿名親母香阿  
信迷又執圓分十  
神拜共香燒夜祇  
人信不命算信祇



階玉黃友男香阿  
愛戀就小從人二  
猜無兩馬仔梅青  
來將等印相心心

進口。

至於本病的治療，因為平常不呈現特異的症狀，畜主都是看到流產才知道有問題，而流產了以後再進行治療，在時間上既不經濟，治療是否完全，使其不散播病源又是一個疑問。

又如以後再交配，每次不受孕或受孕至七、八個月時再來一次流產，損失更為慘重。所以，一般的處理方法，是將反應陽性的牛淘汰，送往屠宰場宰殺，不作治療。希望飼養乳牛的農友們合作，共同來防治乳牛流產病。

米  
米  
米  
米  
米

## 你喜歡新品種檸果嗎？


鳳山熱帶園藝試驗所，於七年前由美國引進多種檸果優良品種，經多年來栽培觀察結果，發現其中三種具有產量高品質好等特性。你喜歡新品種檸果嗎？將本地種檸果枝鋸斷，高接新品種枝條，就可以生產新品種檸果的果子。

檸果是夏天消暑可口的水果，本省南部栽種最多，都是本地種，很甜，可是纖維粗，果形小，肉薄，種子大，為其缺點。而南洋種大檸果，一般人都覺得淡而無味，其實像「懷特」這個品種，味道清香，肉質細膩，是不可多得的南洋檸果好品種。


鳳山熱帶園藝試驗分所，於七年前由美國引進多種檸果優良品種，經多年來栽培觀察結果，發現有三個品種產量品質非常好，同時還具有下列六大特點：①皮色艷麗 ②果形美觀 ③甘甜可口 ④核小肉厚 ⑤風味清香 ⑥極少纖維

品 質	中上	吉	祿	海	頓	愛	文	習性	品種	樹勢	生長快慢	枝條狀態	花期長短	葉形	果皮色	病蟲抵抗力	成熟期
								性	品種	勢	快慢	狀態	長短	形	皮色	抵抗力	成熟期
品 量	中	稍大開張	較大開張	矮小	中	中	中	中	紅斑黃帶淡紫	中	中	中	中	漸尖狹長	紅斑黃帶淡紫	中	五至七月
產 量	中	大	大	慢	快	快	慢	慢	橘黃帶紅斑	橘黃帶紅斑	強	強	短	尖長寬	橘黃帶紅斑	中	六至七月
質 量	中	大	大	慢	強	強	強	強	橘黃帶紅斑	橘黃帶紅斑	強	強	長	闊	橘黃帶紅斑	高	五至六月

因此二年以前，即開始先後在高雄縣大樹、佳冬，臺南縣新化等地，將本地種大枝鋸斷後，高接新品種枝條，現在，有的已經開始結果了。現在就把這三個品種的樹勢、成熟期等特性，比較如上表，供農友們參考。



## 王兆全



，意同已慎阿在現  
，妻夫二應答後婚  
，利吉大滿美南  
。喜歡真往來家

止停哭香阿  
，死(要)卜想煩日(夜)眠  
。起救來人路得幸

，陪玉黃嫁阿  
，害屬反命算從  
。來往(們)他因絕拒此