

早播胡蘿葡

始開中月七 生進王

胡蘿葡生育初期比較耐熱，本省可以提早於七月中旬播種，十月中旬開始收穫。但是此時驟雨頻繁，並易遭受颱風打擊，因而必須注意左列幾項，才能保證栽培成功。

選擇沖積砂質壤土栽培

沖積地耕土深厚，排水良好，不致引起長時間的積水，而且在夜間還有旺盛的毛細管作用，使土壤獲得充分的濕度，供給胡蘿葡生育所需要的水分。但是一般沖積土壤都在河川地帶，容易在颱風期淹水，所以應該選擇較高的地點栽培。

撒佈烏肥減少土壤病害

每十公畝撒佈四十五至五十四公斤的氮化鈣，立即耕耘，經過十二天左右後播種。這樣處理土壤，既可減少白絹病、菌核病的發生，又能促進胡蘿葡中期的發育。（因為氮化鈣在土壤中變成碳酸態氮素

，肥效較長。）

種子消毒減少幼苗立枯

在七月中播種的胡蘿葡，發芽後易於發生幼苗立枯；這是由於胡蘿葡黑斑病菌附着種子或從土壤傳染而引起的。為預防幼苗立枯，應在播種前用百分之五的「賜保根」消毒種子。

下種前催芽提高發芽率

胡蘿葡的種子，在攝氏二十五至三十度間發芽還好，但是超過攝氏三十度就差。

七月間的氣溫，有時超過三十度，而且雨量分佈不平均，影響發芽率不小。所以在這時期栽培胡蘿葡，應先行催芽後播種。

催芽的方法：將種子與濕潤的河砂（海砂含有鹽分，不可使用）混合，放在較冷的地方，等到種子剛剛萌芽時，將種子和河砂一起下播。或將種子用清水浸漬四十八小時（其間須換水三至四次以免種子窒息）後，拿出鋪在小型竹籬中（厚度五至六公分），並放置於冷處如水缸旁等催芽，等到萌芽後立即播種。但是經過催芽的種子，必須播在濕度適宜的土壤，才能順利出土；如果土地過乾，必須先行灌溉，否則必因種子水分被土壤吸取而致幼芽枯萎。

覆土蓋草並行噴洒灌溉

播種後需行覆土，厚度以種子不露出地面為準；太厚時反會影響種子發芽。覆土後還需覆蓋稻草，以免驟雨沖失表土或種子。

農藥成份標準 保證品質優良

經銷處

- | | | |
|-------------------|--------------|----------|
| 臺北市迪化街一段249號 | 茂興農藥行 | 電話 46732 |
| 臺北市迪化街一段86號 | 臺灣農藥資材股份有限公司 | 電話 44253 |
| 桃園市新屋鄉新生村 | 建德藥米廠 | 電話 39 |
| 新竹市東門街73號 | 大豐商行 | 電話 600 |
| 苗栗縣勝利里71號 | 榮美商行 | 電話 63轉 |
| 臺中縣美里鄉中正路327號 | 美豐商行 | |
| 連絡處①員林鎮中山路 | 伊秋種子行 | |
| ②永靖鄉中山路 | 厚秋種子行 | |
| ③屏東市民生路194號 | 美豐行分店 | |
| 臺中市興中街13號 | 國泰藥業行 | 電話 4384 |
| 臺中市同七路一段五號 | 進豐行 | 電話 3267轉 |
| 南投縣南投鎮民族路113號 | 泰生保藥業 | 電話 22 |
| 南投縣竹山鎮雲林路30號 | 新進商行 | |
| 雲林縣虎尾鎮光復路43號 | 惠豐農藥資材行 | 電話 238 |
| 嘉義縣溪竹鄉六柱村三鄰199號 | 年豐農藥行 | 電話 17之1 |
| 臺南市公園路173號 | 蓬萊農藥資材行 | 電話 3497轉 |
| 高雄市中正路180號 | 益豐藥行 | 電話 3169 |
| 高雄縣鳳山鎮第一市場內 | 慶豐西藥行 | 電話 5505 |
| 屏東市民生路294號 | 信全藥業行 | 電話 996 |
| 屏東縣長春里民生路86號 | 和豐藥業行 | 電話 536 |
| 屏東縣中華路219號 | 豐樂藥業行 | 電話 553 |
| 花蓮市中山路臨8號（彰化銀行對面） | 邱國成種子行 | 758 |




巴拉松乳劑
PM乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑



中農化工廠股份有限公司出品

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣景美鎮中正路三一七號



苗莖胡播早的好良育生

盜蟲及小地蠶。如有黃化病(毒素病)發生，應早期拔除病株，並澈底防治蚜蟲。

，以節省勞力。
如有蚜蟲發生，可將「馬拉散」與「大生」或「石灰波爾多液」混合使用，發芽後，應每隔二星期噴射二五%DDT乳劑五百倍液一至三次，以防除夜
波爾多液」都可以應用。
噴射「大生七八」四百倍液，效果也很好，但須加用展着劑如「理農」、「萬農」等。

及時噴藥澈底防治病蟲

胡蘿蔔噴射銅劑，可以防治由空氣傳染的多種病害；四一六斗式的「石灰波爾多液」都可以應用。
噴射「大生七八」四百倍液，效果也很好，但須加用展着劑如「理農」、「萬農」等。
如有蚜蟲發生，可將「馬拉散」與「大生」或「石灰波爾多液」混合使用，發芽後，應每隔二星期噴射二五%DDT乳劑五百倍液一至三次，以防除夜盜蟲及小地蠶。如有黃化病(毒素病)發生，應早期拔除病株，並澈底防治蚜蟲。

混植蘿蔔缸豆保護幼苗

本省的「大白枝」或「牛棧仔」種蘿蔔都很耐熱，所以如與胡蘿蔔混作，就能靠它的遮蔭來保護胡蘿蔔的幼苗，渡過炎熱的時期；但需等到蘿蔔收穫後才施行施肥中耕。
缸豆生育後期，在畦的兩旁點播胡蘿蔔，也可獲得良好的結果。

增加播種量並及時間拔

胡蘿蔔早期栽培，宜將播種量較適期栽培時增加五成左右。
在氣候不順時採用密播，成績會較好，但是應在本葉三枚左右時，依生育情形分三次舉行間拔。
播種後最好用噴洒灌溉方法來補給水分，如用水壺(水孔愈細愈好)或旋轉式噴洒灌溉設備，在傍晚或早晨舉行灌溉皆可。
日間灌溉會引起嚴重立枯病和根部腐爛，必須避免。



五豐商標

五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市中正路1791號二樓
電話：31691
工廠：北基公路七堵草蓋站旁
電話：七堵36號

經 銷 處

- ①臺北市迪化街 臺灣農產企業公司 電話 44253
- ②臺中市三民路一段175號 信全農藥行 電話 3343
- ③員林中山路229號 信全農藥行 電話184
- ④雲林斗南鎮南昌里新興街30號 永豐農資材行 電話 174
- ⑤嘉義縣義竹鄉大柱村201號 豐安藥房 永豐農藥行 電話 4971
- ⑥臺南市東門路140號 農友農子行 福源問號
- ⑦高雄縣鳳山鎮第二市場內
- ⑧高雄路竹鄉竹西村170號
- ⑨宜蘭縣農會及各鄉鎮農會
- ⑩桃園縣農會及各鄉鎮農會
- ⑪新竹縣農會及各鄉鎮農會
- ⑫苗栗縣農會及各鄉鎮農會
- ⑬臺南縣農會及各鄉鎮農會
- ⑭嘉義縣農會及各鄉鎮農會
- ⑮高雄縣農會及各鄉鎮農會
- ⑯屏東縣農會及各鄉鎮農會

