



苗莖胡播早的好良育生

盜蟲及小地蠶。如有黃化病(毒素病)發生，應早期拔除病株，並澈底防治蚜蟲。

，以節省勞力。  
如有蚜蟲發生，可將「馬拉散」與「大生」或「石灰波爾多液」混合使用，發芽後，應每隔二星期噴射二五%DDT乳劑五百倍液一至三次，以防除夜

**及時噴藥澈底防治病蟲**

波爾多液」都可以應用。  
噴射「大生七八」四百倍液，效果也很好，但須加用展着劑如「理農」、「萬農」等。  
胡蘿蔔噴射銅劑，可以防治由空氣傳染的多種病害；四一六斗式的「石灰

**混植蘿蔔缸豆保護幼苗**

本省的「大白枝」或「牛棧仔」種蘿蔔都很耐熱，所以如與胡蘿蔔混作，就能靠它的遮蔭來保護胡蘿蔔的幼苗，渡過炎熱的時期；但需等到蘿蔔收穫後才施行施肥中耕。  
缸豆生育後期，在畦的兩旁點播胡蘿蔔，也可獲得良好的結果。

**增加播種量並及時間拔**

胡蘿蔔早期栽培，宜將播種量較適期栽培時增加五成左右。  
在氣候不順時採用密播，成績會較好，但是應在本葉三枚左右時，依生育情形分三次舉行間拔。  
播種後最好用噴洒灌溉方法來補給水分，如用水壺(水孔愈細愈好)或旋轉式噴洒灌溉設備，在傍晚或早晨舉行灌溉皆可。  
日間灌溉會引起嚴重立枯病和根部腐爛，必須避免。



五豐商標

**五豐化學工業股份有限公司**

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市中正路1791號二樓  
電話：31691  
工廠：北基公路七堵草蓋站旁  
電話：七堵36號

**經 銷 處**

- ①臺北市迪化街 臺灣農產企業公司 電話 44253
- ②臺中市三民路一段175號 信全農藥行 電話 3343
- ③員林中山路229號 信全農藥行 電話184
- ④雲林斗南鎮南昌里新興街30號 永豐農資材行 電話 174
- ⑤嘉義縣義竹鄉大柱村201號 豐安藥房 永豐農藥行 電話 4971
- ⑥臺南市東門路140號 農友農子行 福源問號
- ⑦高雄縣鳳山鎮第二市場內
- ⑧高雄路竹鄉竹西村170號
- ⑨宜蘭縣農會及各鄉鎮農會
- ⑩桃園縣農會及各鄉鎮農會
- ⑪新竹縣農會及各鄉鎮農會
- ⑫苗栗縣農會及各鄉鎮農會
- ⑬臺南縣農會及各鄉鎮農會
- ⑭嘉義縣農會及各鄉鎮農會
- ⑮高雄縣農會及各鄉鎮農會
- ⑯屏東縣農會及各鄉鎮農會

