

〔問〕：據報載香港康生鴿場，以孵蛋器孵出小鴿後，用人工飼養乳（幼）鴿。本人也想用此法，現有以下幾點疑問，請惠教。

〔一〕孵蛋器的溫度如何？〔二〕乳（幼）鴿的飼料如何配合？〔三〕如何給飼？〔四〕乳飼的保溫用何法？〔五〕世界何種鴿生產力較強？〔六〕如要向國外購入該鴿種用何法？敬請賜教。（嘉義縣大腳鄉呂瀛洲）

〔答〕：〔一〕關於孵蛋器孵化器之溫度照學理應在華氏 103—105 之間（因一般不用水浸散後，壓成糊狀）。〔三〕弄成小圓粒同，惟育雛箱宜小些，使溫度不易散失。〔五〕飼與。〔四〕乳飼的保溫可與育小鴿之方法相同，惟育雛箱宜小些，使溫度不易散失。〔五〕世界鴿之品種很多，多產適合肉飼生產者，如美國之白色皇帝鴿（White King）。〔六〕關於引進鴿之手續，請函省農林廳畜牧課查詢。（李登元）

種用花椰菜

慎選純品種

〔問〕：因我所栽種之新品種，晚生花椰菜，其成績頗佳，現在已開花了，我欲自己留種，請快賜教其留種法。（南投縣魚池鄉李雲清）

〔答〕：〔一〕留種用花椰菜，必須品種純正，尤其花蕾之緊密度，色素及結實期之整齊，是非常重要的。為鑑定花蕾之色素，不可用葉來覆蓋花蕾。

〔二〕隨着抽苔之進行應適宜剪，祇留花蕾中心之強壯的花枝數枝就好。若不行間拔花枝，其花枝過於密生，無法伸長引起腐敗，或無法着生正常的花，故採種量極差。間拔花枝之切口，宜用硫黃草或石火塗付，以防腐爛，經常噴射馬拉松與大生混合液，防治蚜蟲及露菌病，使母株生育正常以利開花結果。

（三）俟花枝先端之莢內種子稍變褐色時（用手指剖開莢），開始採收，並將採收之枝梗例懸在空內風乾及追熟，四十五天後始可陽乾，陽乾時不可將自然脫落下來，尙未充分乾燥的種子曝露陽光，以防發芽率之降低，故用炭殼或麻布覆蓋種子，晒至水分含量一二%為止。

（四）採種圃之周圍最低須與甘藍、球莧、甘藍、芥藍等，青花等及其他花椰菜品種隔離五〇〇公尺，但採種圃面積甚小時，宜與上列雜交作物隔離八〇〇公尺以上。（王進生）

姑婆芋養豬

不是好飼料

〔問〕：在本刊十二卷四期三十六頁，農業信報裡有一則「野生姑婆芋」的用途，敝處該物甚多，我想採用他，但有問題數條，請貴社指教為盼。

〔一〕野生姑婆芋頭內，含有一種成份（咬人），如用手處理芋頭時，或碰到皮膚時，會發生「咬人」的性質，經過充分煮熟後，仍會發生「咬人」的性質，用何法可使他不（咬）皮膚？

〔二〕姑婆芋里芋頭含有幾成的蛋白質？以上數題請答覆為盼！（花蓮市陳本三）

〔答〕：〔一〕野生姑婆芋經過充分煮熟後，其成分（擾人）變為不溶解性，故不會引起養人的現象，若仍有此種現象發生，應繼續煮熟，目前沒有方法（用藥劑）使它變成不溶解性。


〔二〕單用姑婆芋飼養豬是不太好，最好與其他飼料混用。

喫肥大

抗生素綜合維他命礦質補助飼料

飼料店，農會均售

曲譜飼料二九三六年益源西藥房



除虫吃喫肥大加倍肥壯健康



促進產卵
預防疾病
每盒 6 元



益源製藥所
台北市羅斯福路三段二七二號

中日牌全完飼料

飼料全完飼養

種類
初雛用
中雛用
大雛用
——
蛋鷄用
種鷄用
肉鷄用
——
六種


臺北市信陽街二三號 電話三二五五一一

中日牌養鷄完全飼料 是

本省首創民營最完善之飼料公司出品，品質精良、營養豐富、無論何種鷄禽，經常使用均有滿意之效果。

中日飼料股份有限公司

母猪哺乳期注意飼料



[問]：我家中飼養母豬一頭，最近分娩，共八隻，其間均很順利，無任何其他異狀，然分娩後，約兩星期，母豬却發生異狀，其症狀如下：即是母豬全身會發抖，食慾減退，外陰部有點紅，呼吸時急促，發抖時（站着時）頭偏於右邊，並常伏着，不給仔豬吃乳。有人欲去接生時，發出號聲，狀如欲咬人狀。飼猪先生說，是豬「非瘦」不知道是否，並且吃那先生的藥，並未好轉，請問是何病症？應如何治。

[花蓮縣光復鄉張進富]

[答]：據你所說的情形，你的母豬發抖即有發燒的現象，在哺乳期內開始餵料太多，很可能使母豬乳房腫脹發燒，很痛而不願給仔豬吸乳。以後母豬生產初期，應注意飼料開頭少給，每日漸漸增加，到兩星期時才給全量。像發生這種乳房炎，請獸醫注射抗生素藥物，如配尼西林等有效果。（李登元）



耕地水份蒸發抑制劑

有利秧苗生育及成長

[問]：（一）過去看到報紙報導，在本省南部魚塭使用水溫上昇劑「OED」，

增加水溫，促進魚成育得到良好效果，又會讀日本書刊，用該劑使用於水稻苗圃，提

高寒帶水溫，促進稻苗發育等事，是於乞教使用法。

（二）本省北部第一期作用苗圃（水稻）若用該劑者，能否促進苗之成育增加產量。

（三）有價值，有需要使用者，請賜教其

使用法。

（四）「OED」在本省何處有販賣，價格如何？（桃園縣八德鄉呂郭英）

[答]：（一）據本局於五十年第一期稻作

期間，試驗結果，使用該劑（OED）以後，平均可提高稻田水溫攝氏二度，有利秧苗生育，至於可增加產量多寡乙節，現仍在試驗中。

（二）耕地水份蒸發抑制劑（OED）之使用方法：

① 抑制劑的使用時期及數量：第一期稻作秧田期間，自播種起至插秧前五十坪田，使用三十公克本田一分地，自播秧起至三星期間，使用二百公克。

② 抑制劑之調製及使用：（甲）糊狀抑制劑將五十公克之抑制劑，以一二〇公克微溫湯調製成糊狀抑制劑，然後各以網狀布片及小長孔膠布包之，以每三〇公克包成一包以網狀，希包者吊於田中水流入口處，以小長孔膠布包者，吊於田中任何處所。（乙）乳狀抑制劑，將五〇公克粉未抑制劑，以十公升之水，徐徐加入攪拌，成乳液抑制劑後，裝入撒水機噴霧機，或用手撒佈於秧田及本

（三）注意事項：（甲）為防止水田上抑制劑薄膜之流失，在田水流出口處，以兩片小板做成小水閘，以防止抑制劑之流失。（乙）在水面上之抑制劑薄膜，如被大雨衝走，須再撒佈乳液抑制劑，以補其不足水面上薄膜之有無鑑定，可將DDT粉或痱子粉包裝在粗網狀布中，撒佈於該水田上，然後以一枝頂端附一小塊糖狀抑制劑，接觸於水面而

DDT粉或痱子粉成圓狀展開時，則表示缺少抑制劑，須再撒佈乳液抑制劑，如不展開，則表示抑制劑充足，可不補充。（丙）白畫盡量使田中之水位降低，以免抑制劑之薄膜，被風吹堆一起而失去抑制，水分蒸發防止水溫被奪之效。（丁）使用抑制劑後，水溫上升，水稻生育可較良好，故應適當增加施肥，以期收量提高。

○○○農業種子行
精農：答，請問，外銷蔬菜類何種好。
大信農產行 篤農：答，洋蔥，胡蘿蔔，大頭菜是第一好。
◎◎◎根益種子行 篤農：再問，品種何種最適宜。
◎◎◎榮華種子行 精農：答，洋蔥是美國E+G球形四粒球牌，胡蘿蔔是美國六

臺北市延平北路二段一四七巷六號

電話四一九三七

臺北市延平北路二段一九三號

臺灣割儲三八三號

臺北市延平北路二段一九五號

電話四一八五九

臺北縣三重市三和路三段七號

割儲三三四五號

臺灣割儲一三五七一號

電話四三一九六轉

臺北縣三重市重新路一段七二號

電話四三一九六轉

以上各行有今年進口新子，發芽甚好，現貨供應，價錢相宜。

尿素肥效等於硫酸銨 22 倍

尿素中性連續使用保證無害

其他化學肥料

氯化鉀	過磷酸鈣	硫酸銨鉀	化成氣磷
成份保證 肥效大			
台灣肥料股份有限公司			
台北市衡南路九十一號 電話二五六四一—四			

嘉義 清河 夏季優良種子

白仁黑鬼豆子（八月菜豆子）
一代理想早生五十天甘藍子

60天長種冬瓜白菜頭子
60天短種菜頭子

黑仁青格菜豆子（紅蒂尾）
黑仁敏豆子

紅仁白格菜豆子（紅蒂尾）
紅仁白豆子

美國大五寸人參子
美國大五寸人參子

幼葉豆子（菜豆）
幼葉豆子

育江白菜子
育江白菜子

清天油菜子
清天油菜子

粗末苦瓜子
粗末苦瓜子

嘉隆早生一號甘藍菜子
嘉隆早生一號甘藍菜子

早生55天白納晶花椰子
早生55天白納晶花椰子

白耳黑鬼豆子
白耳黑鬼豆子

蘇魯種矮脚木瓜子
蘇魯種矮脚木瓜子

黃梨仔瓜子
黃梨仔瓜子

白木耳種菌
白木耳種菌

最強力松茸（洋菇）種菌
最強力松茸（洋菇）種菌

金瓜（南瓜）子
金瓜（南瓜）子

厚木耳種菌
厚木耳種菌

烏龍種大號應菜子
烏龍種大號應菜子

白耳種菌
白耳種菌

40天長種馬耳炮菜頭子
40天長種馬耳炮菜頭子

50天大白炮菜頭子
50天大白炮菜頭子

白虎耳杏菜子
白虎耳杏菜子

蘇魯種矮脚木瓜子
蘇魯種矮脚木瓜子

二ユメロン子
二ユメロン子

白中生白葉白骨芹菜子
白中生白葉白骨芹菜子

其中30天包心白菜之最佳期間，由農曆二月下旬至七月止，第一期水稻區均可播植，
其它各色種子及農藥，應有盡有，歡迎賜顧為幸。

另敬行之新聞、農業栽培法種子目錄於新曆六

月下旬可出刊，請有需要之農友付郵三元
索取即寄。

請向

飼料農業店採購。

臺灣總代理
總經銷 福孚

臺北市南陽街四十六號
電話三一四四九

美行 學美

賽文是什麼？



【問】：(一) 在孵化中的母雞有雞虱，應如何處理？(二) 種蛋已經孵化了十六天，而在種蛋內放一些乾薑茶，以減雞虱，但是不知會影響以後的幼雛嗎？(三) 雞虱在人體上，是否對人體會發生什麼影響。(彰化縣員林鎮曹天性)

【答】：(一) 用氯化納驅除雞虱，效果較大，用時宜將白色粉末狀的氯化納，撒在雞的胸前，大腿和肛門下，背部兩側，頭及頸部，可用手指擦在羽毛裡。

(二) 用於藥物除雞蟲比較安全，但效果稍差，雖不致影響雞鵝，但不如將薑茶末早日遍撒入雞體上。

(三) 雞蟲對人體不會發生影響。(周光宇)

· 讀者服務部小啓 ·

羅濟堂 詹慶宇 徐文通 江瑞模
黃榮木 郭德吳 武雄 王毛
其溫禎祥 吳至祥

以上各位農友的問題，已送請專家解答，請等候本社的回答。

效果：具有廣泛而特殺蟲效果，對人畜毒性極低，對植物完全無害，藥效半衰期甚高，在日光暴曬後不損藥效。或久藏後的不損藥效。

特性：是新式的殺蟲劑，其主要有效成份既非有機磷，亦非有機氯化物，而是 1-Naphthyl N-Methylcarbamate 保美國永儲公司的榮譽出品。

對防蟲：對治稻浮塵子、稻黑椿象、大豆害蟲、玉米螟、蔬菜害蟲、黃守瓜、茶遊價蛾、茶捲葉蟲、茶浮塵子、小白紋毒蛾、柑桔角肩椿象、棉花害蟲、甘諾蝶類天蠅等害蟲確有顯著效力。

對防蟲：又根據美國報告及本實驗，賽文亦為家庭及禽畜用之殺蟲劑，可以消滅臭蟲、跳蟲、蠅蟲、狗蠅、蟑螂、牛虻、蔬菜害蟲、黃守瓜、茶遊價蛾、茶捲葉蟲、茶浮塵子、小白紋毒蛾、柑桔角肩椿象、棉花害蟲、甘諾蝶類天蠅等害蟲確有顯著效力。

對防蟲：又依照原方精工配製 1.5% 粉劑及家庭禽畜用殺蟲劑，使用「福農」牌商標大量供應本省各界。

