

孵蛋器溫度

應在華氏 103—105 間

【問】：據報載香港康生鴿場，以孵蛋器孵出小鴿後、用人工飼養乳(幼)鴿。本人也想用此法，現有以幾點疑問、請惠教。

(一) 孵蛋器的溫度如何？(二) 乳(幼)鴿的飼料如何配合？(三) 如何給飼？(四) 乳鴿的保溫用何法？(五) 世界何種鴿生產力較強？(六) 如要向國外購入該鴿用何法？敬請賜教。(嘉義縣大脚鄉呂瀛洲)

【答】：(一) 關於孵蛋器之溫度照學理應在華氏 103—105 之間(因一般不用孵化器孵鴿蛋、無實地經驗。)(二) 不妨一試。

(三) 乳鴿的飼料多用單獨谷類、將谷類飼料用水浸軟後、壓成漿糊狀。(四) 弄成小圓粒飼與。(五) 乳鴿的保溫可與育小鴿之方法相同、惟育雛箱宜小些使溫度不易散失。(六) 世界鴿之品種很多、多產如適合肉鴿生產者、如美國之白色皇帝鴿(White King)。

(七) 關於引進鴿之手續、請函省農林廳畜牧課查詢。(李登元)

種用花椰菜 慎選純品種

【問】：因我所栽種之新品種、晚生花椰菜、其成績頗佳、現在已開花了、我欲自己留種祈快賜教其留種法。(南投縣魚池鄉李雲清)


【答】：(一) 留種用花椰菜、必須品種純正、尤其花蕾之緊密度、色素及結蕾期之整齊、是非常重要的。為鑑定花蕾之色素、不可用葉來覆蓋花蕾。

(二) 隨着抽苔之進行應適宜間、祇留花蕾中心之強壯的花枝數枝就好。若不行間拔花枝、其花枝過於密生、無法伸長引起腐敗、或無法着生正常的花、故採種量極差。間拔花枝之切口、宜用硫磺草或石灰塗抹、以防腐爛、經常噴射馬拉松與大生混合液、防治蚜蟲及露菌病、使母株生育正常以利開花結實。

(三) 俟花枝先端之莖內種子稍變褐色時(用手指削開莖)、開始採收、並將採收之枝梗例懸在空內風乾及過熱、四—五天後始可陽乾、陽乾時不可將自然脫落下來、尙未充分乾燥的種子曝露陽光、以防發芽率之降低、故用荻殼或麻布覆蓋種子、晒至水分含量一二%為止。

(四) 採種圃之周圍最低須與甘藍、球莖甘藍、芥藍等、青花等其他花椰菜品種隔離五〇〇公尺、但採種圃面積甚小時、宜與上列雜交作物隔離八〇〇公尺以上。(王進生)

姑婆芋養豬 不是好飼料



【問】：在本刊十二卷四期三十六頁、農業信箱裡有一則「野生姑婆芋」的用途、敝處該物甚多、我想採用他、但有問題數條、請貴社指教為盼。

(一) 野生姑婆芋內、含有一種成份(咬人)、如用手處理芋頭時、或碰到皮膚時、會發生「咬人」的性質、經過充份煮熟後、仍會發生「咬人」的現象、用何法可使他不(咬)皮膚？

(二) 單用姑婆芋來飼豬可以嗎？

(三) 姑婆芋里芋頭含有幾成的蛋白質？以上數題請答覆為盼！(花蓮市陳本三)

【答】：(一) 野生姑婆芋經過充份煮熟後、其成分(咬人)變為不溶解性、故不會引起癢人的現象、若仍有此種現象發生、應繼續煮熟、目前沒有方法(用藥劑)使它變成不溶解性。

(二) 單用姑婆芋飼養豬是不太好、最好與其他飼料混合。

(三) 姑婆芋之蛋白質含有量不詳、普通里芋含有二—三〇%左右的蛋白質。(王進生)

中日牌 養雞完全飼料

料飼全完鷄養

中日牌養雞完全飼料 是

本省首創民營最完善之飼料公司出品、品質精良、營養豐富、無論何種鷄禽、經常使用均有滿意之效果。

- 種類
- 初雛用 蛋鷄用
- 中雛用 種鷄用
- 大雛用 肉鷄用
- 六種

中日飼料股份有限公司

臺北市信陽街二三號 電話三三五五—三〇六三四號

大肥 嘸


飼料補助質礦他命維綜合素抗

除虫吃嘸肥大加倍肥壯健康

飼料店、農會均售



每包35元



促進產卵 預防疾病



每盒6元



驅虫良藥

源製藥所 台北市羅斯福路三段二七二號

由購宅碼二二九三六零益源西藥房 購滿二包免郵費