

驅除鷄虱

用氯化鈉



【問】：(一)在孵化中的母鷄有鷄虱，應如何處理？(二)種蛋工經孵化了十六天，而在種蛋內放一些乾菸葉，以滅鷄虱，但是不知會影響以後的幼雛嗎？(三)鷄虱在人體上，是否對人體會發生什麼影響。(彰化縣員林鎮曹天性)

【答】：(一)利用氯化鈉驅除鷄虱，效果較大，用時宜將白色粉末狀的氯化鈉，撒在鷄的胸前，大腿和肛門下，背部兩側，頭及頸部，可用手指擦於在羽毛裡。

(二)用於葉驅除鷄虱比較安全，但效果稍差，雖不致影響雛雞，但不如將菸葉末早日遍行擦入鷄體上。

(三)鷄虱對人體不會發生影響。(周光宇)

防治在來稻熱病

插秧後用大好年

【問】：一、關於在來稻種消毒，可否如蓬萊稻種一樣，用谷樂生1000倍水溶液，浸種一小時後洗淨並芽下種？但聽說在來種會發生藥害，如果確實的話應用何種藥劑消毒？二、在來種插秧後防治稻熱病應用何種藥劑最有效？(臺南縣仁德鄉張百)

【答】：(一)種子消毒可以用谷樂生與蓬萊一樣。(二)葉稻熱病及穗頸稻熱病應用大好年或大生粉。(三)插秧後應用大好年，較無藥害。(余慶東)

讀者服務部小啓

羅濟堂 詹震宇 徐文通 江瑞棋
黃榮木 郭 衛 吳武雄 王 毛
李 其 溫禎祥 吳至祥

以上各位愚友的問題，已送請專家解答，請等候本社的回答。

嘉 清河夏季優良種子

- 白仁黑鬼豆子(八月菜豆子)
- 一代理想早生五十天甘藍子
- 白花格藍菜子
- 早生30天青粉菜包心白菜子
- 長岡一號甘藍菜子
- 碩莪型下マト子
- 烏龍種大號藍菜子
- 白木耳種齒
- 40天長種馬耳挖菜頭子
- 白虎耳香菜子
- 金瓜(南瓜)子
- 青皮大麥胡瓜子
- 早中生白葉白骨芹菜子
- 其中30天包心白菜之栽植期間，由農曆二月下旬至七月止，第一期水稻區均可播植，其它各色種子及農藥，應有盡有，歡迎賜顧為幸。
- 另啟行之新園藝栽培法種子目錄於新曆六月下旬可出刊，請有需要的農友付郵三元函索即寄。
- 60天長種冬瓜白菜頭子
- 60天短種菜頭子
- 紅仁白格二尺半長菜豆子
- 黑仁青格菜豆子(紅番尾)
- 黑仁嫩豆子
- 想思獨子
- 80天油菜子
- 清河改良白菜子
- 早生55天純白精品花椰子
- 嘉隆早生一號甘藍菜子
- 嘉隆早生二號甘藍菜子
- 早生扁甲芥菜子
- 早中生黃心白骨芹菜子
- 粗末苦瓜子
- 育江白菜子
- 美國大五寸人參子
- 幼葉白豆子(菜豆)

清河種子行

嘉義市中正路四八二號
電話三五八四號
劃撥儲金嘉字八〇〇三七號

賽文是什麼？

SEVIN



是新式的殺蟲劑，其主要有效成份既非有機磷，亦非有機氯化物而是 1-Naphthyl N-Methylcarbamate 係美國永備公司的榮譽出品。

特性：具有廣泛獨特殺蟲效果，對人畜毒性極低，對植物完全無藥害，藥效安定性甚高，在日光紫外線攝氏七十度高溫下或久藏後的不損藥效。

效果：賽文50%可濕性粉劑經臺灣省植物保護技術委員會推許，對防治稻浮塵子、稻黑椿象、大豆害蟲、玉米螟、蔬菜害蟲、黃守瓜、茶葉債蛾、茶捲葉蟲、茶浮塵子、小白紋毒蛾、柑桔角盾椿象、棉花害蟲、甘蔗蝦蟇天蟬等害蟲確有顯著效力。

又根據美國報告及本行實驗，賽文亦為家庭及禽畜用之殺蟲劑，可以消滅臭蟲、髮蟲、雞蟲、狗蟲、蟻、牛蟻、蝨等，如依法使用不但效力顯著且對於人畜無害，具有其他殺蟲劑所不能兩全的特別性能。

銷售：敝行除進口原裝賽文50%可濕性粉劑外，並進口工業級賽文依照原方精工配製1.5%粉劑及家庭禽畜用殺蟲劑，使用「福農」牌商標大量供應本省各界。

請向飼料農藥店採購。

臺灣總代理 孚美行
總經理 福美行
臺北市南陽街四十六號 電話三一四四九