

問明農藥的種類，以便採取適當的救治方法。  
如果中毒的是有機磷劑，應用「阿脫品」和「巴姆」解毒，但仍需以「チオクタン」、「グロンサン」、「リッゲル」及強心劑等配合治療。

如果是「氣拉多」中毒，應施行洗胃，並用「チオクタン」、「グロンサン」及強心劑等治療。  
對於「殺鼠靈」的中毒，應使用「維他命K」、「維他命C」、「アドナチン」及「リッゲル」。

至於「安特靈」的中毒，輕症可注射鎮靜劑「バルビタール」和強心劑。重症很難治好。

### 阿脫品·巴姆效力高

我遇到的農藥中毒病例，還是以「有機磷劑」為多。對於有機磷劑的中毒，我併用「阿脫品」和「巴姆」二種藥劑，都得到很滿意的治療效果。治療方法因病情輕重而不同：

輕症：用「阿脫品」一支，葡萄糖一支，強心劑一支，混合注入靜脈。十分鐘後，如果瞳孔尚未恢復，繼續流汗，並有吐意，就再注射一次。

中症：「阿脫品」一至二支、「巴姆」一支、強心劑一至二支、葡萄糖一支，混合注射。

重症：由中症變重症時，每隔五至十分鐘，照中症處方注射一次，繼續三次。

### 輕症重症都可治

依我的經驗，採用上面的方法救治有機磷劑中毒，無論輕症重症，都是萬無一失的。當我接到有機磷劑中毒報告的時候，先檢查患者呼吸，只要呼吸還沒有停止，總是可以獲救的。

農藥中毒並不是難治的病症。萬一病人發生意外，只要不是由於醫師的過失，病人家屬和農會負責人員，一定可以諒解的。

我希望在農村的各位同業，認識救

治農藥中毒的重要性，多替農友們服務。同時也要求各位農友了解醫治的經過。不幸中毒了以後，除了趕快請醫生診治外，並向農會負責人報告。

### 預防藥劑吃不得！

一般有機磷劑的中毒，都在接觸農藥後六至十二小時內發生。可是最近我遇到二個病人，是在噴過農藥後四、五日，才發生中毒現象的。據這二位病人說，他們在噴藥前曾吃了「阿脫品片劑」和「ロートエキス」，賣藥的商人告訴他們說，這些藥可以預防農藥中毒，不需注意防毒的措施。

據我所知，這二種藥劑，只能延長中毒發作的時間，並沒有預防中毒的效果。而且，中毒發作時間延長時，會引起肝臟的毛病，後果將更為嚴重。前面所說的二位病人，為了治療併發的肝病，到目前已費了一個多月，時間金錢的損失，都是很大的。所以，我要奉勸各位農友，千萬不要隨意服用什麼「中毒預防劑」之類的藥劑，最要緊的，還是遵照農會人員的指示，小心使用農藥。（高顯貴）

### 農工化農中 定期 驗血 避免 農藥 中毒

臺北縣景美鎮中農化工廠，是本省頗具規模的一家農藥工廠。為了員工們的生命安全，該廠從五年前，即委託臺灣大學醫學院藥理學科，定期給員工們驗血。凡是驗血結果表示有中毒跡象的，立即調到比較安全的部門工作，並且採取適當的安全措施。

驗血的方法，是測定血液中的「酯化膽素活性價」。無病而沒有接觸過農藥的人，血液中「酯化膽素活性價」通常都在一百左右；如果降低三分之一，就需注意；如果降低一半，就不能繼續工作。

農藥工廠的員工，對農藥的接觸機會，比一般農友要多很多，但是由於這項驗血工作，該廠員工都能安心工作，也很少有中毒情事發生。

我們相信，這種驗血工作，對於經常接觸農藥的工作人員，如能普遍施行，對於農藥中毒的防止，一定有很大的幫助。

據負責這項驗血工作的，臺灣大學醫學院藥理學科張傳炯先生說，「酯化膽素活性價」的測定法有各種，他目前採取的，是最簡單的一種，各地衛生所的技術人員，都不難學會的。（明）

檢驗合格

大東



農藥

效能可靠

農林廳登記第 013. 027. 037. 038. 081. 086. 號

50%巴拉松乳劑

47%巴拉松乳劑

P M 乳劑

馬拉松乳劑

安特靈乳劑

殺鼠劑

其他國外各種殺菌殺蟲劑植物成長劑均有

大東化工廠

臺中市西區三民路一段九七號  
電話：4 6 7 7 號