

# 農友經驗

## 我怎樣防止農藥中毒？

農作物發生病蟲害，用農藥防治確實有效，但在使用農藥時如果不小心，就會發生中毒。要怎樣防止農藥中毒呢？依我的經驗，應注意下列幾點。

- 一、噴藥之前，先準備肥皂、水、食鹽水等，並檢查噴藥器有無漏水。
- 二、調配農藥時，儘量避免吸入揮發的氣體。
- 三、農藥千萬不可入口，也不可接觸皮膚。
- 四、工作時，應該戴起口罩。
- 五、噴射水稻時，應戴橡皮手套，穿長褲及長袖工作衣，同時戴眼鏡。噴射柑桔等大果樹時，應穿防水衣服，並且戴帽子。
- 六、工作衣服被藥液浸濕時，應即更換。換下的衣服，應用肥皂洗淨。
- 七、工作時應儘量站在上風，避免吸入或接觸藥劑，萬一藥劑接觸皮膚，應該馬上用肥皂洗淨。
- 八、工作後，在吃東西或抽香煙之前，要用肥皂洗淨雙手，並用食鹽水漱口。
- 九、工作時間最好不要超過四小時。
- 十、工作完後，應即洗淨雙手、面部及身體各部份，並更換衣服。
- 十一、噴過農藥的區域，應揮紅旗，使別人注意。
- 十二、工作所用的器具，應該用肥皂洗淨，剩餘的藥劑，應放在小孩子不能拿到的地方，不可接近食物，以免發生危險。（高雄市旗山鎮蔡吉雄）


## 注射筒抽農藥

### 準確方便安全

對於防止農藥中毒，四、五年來我是這樣做的

- 一、提取原液時，我用一隻五十立方公分的計量杯先放一點水，再用注射筒抽出需要藥量，注於杯內，並在杯內抽注一兩下，攪散原液，然後倒入噴霧器中。這樣既安全方便，份量也很準確。
- 二、農藥原液絕對不要接觸人體，稀釋液也應盡量避免觸及。
- 三、噴藥期要有充分的睡眠和營養，以旺盛的體力去施藥。
- 四、衣服要盡量被蓋全身，施藥後全部換下，用肥皂洗滌身體，並稍休息。
- 五、後退順風噴藥，並隨時留意風向，如果風向臨時轉向，要立即停止噴射。
- 六、噴藥要二人以上從事，這樣可互相接應。
- 七、使用前先訂噴藥計劃表，依計劃那一天要噴何種藥，幾倍液，第一自己可做參考，第二可使家人在萬一有事時能對救護人員表示。

（桃園縣大溪鎮游山宮）



藥農配調筒射注用利

## 水稻噴藥的二種方法


農藥有毒性，如果不小心使用，對使用人會發生危險。

我噴射殺蟲劑，除了規定事項外，特別注意噴射的方法。我所採用的噴射方法有如下兩種：

一、後退兩面噴射法（請看右圖）：先算稻株左右各十行，用直管射頭，由左至右，再由右至左，順風噴射，如果是西北風，就向稻東南方噴射。

二、前進右方單向噴射法（請看右圖）：遇到逆風時，就要用這種方法，就是說算十行稻株，再加二三行不射，向十三行行間前進，由一至十株，再由十至一株噴射。

用以上兩種方法噴射，我們就不會吸到藥味，藥水也不會飛到身上了。



藥噴向平方右進前和(上)藥噴面二退後

噴射過農藥的稻田菜園，一星期內不可去工作或採食。（臺中縣東勢鎮劉康登）

## 噴藥時間千萬不要過長！

我記得在幾年前用「富粒多」防治水稻螟蟲時，因為我的耕作面積較大，一次噴藥必須繼續幾天才能完成，而且每天的工作時間約九小時，這樣在噴藥的第三天就覺部有得頭暈暈，繼而腹部開始作痛。

停止工作後到農會查詢，才知道是農藥中毒，馬上找醫師打「巴姆」解毒劑。

那次的中毒程度雖未致命，但使我感到恐懼萬分了。事後我檢討工作情形，除了噴藥時間稍長外，並找不出其他疏忽的地方，所以我認為，假使工作時間短一點，那就不致於中毒了。

（彰化縣二水鄉陳基秋）



秋基陳