


救急的後傷咬蛇毒



- 一、在傷口上部，用帶子緊縛。
- 二、用銳利小刀切開傷口，壓出毒液。
- 三、用過錳酸鉀溶液洗淨傷口。
- 四、立刻送入設備完善的醫院救治。

夏天是毒蛇活動的季節，偶不當心，就有被咬傷的危險。如果沒有急救的常識，就有生命的威脅。因此，預防蛇咬傷和咬傷後的急救法，實是不可忽略的事。

練習認識毒蛇

毒蛇有很多種，本省常見的，且傷害人畜最厲害的，有眼鏡蛇（又名飯匙倩）、雨傘節、百步蛇、龜壳花、鎗蛇、赤尾節等。

蛇的種類既然很多，因此

康

想認識是否毒蛇，在毫無經驗的人，是無法認出來的。不過一般說來，有毒的蛇，頭多半呈三角形，尾部驟然細小。最好平時想法去認識牠們，

例如到博物館、或是有蛇標本的地方、或是書本上、照片上去多觀察。常在山地工作的人員，尤其有這種必要。本刊七卷十一期，就曾刊出可怕的毒蛇一文，文中詳述幾種蛇的特徵且附有照片，可請參考。

蛇咬後的症狀

這些毒蛇，除了眼鏡蛇外，很少自動咬人，只有偶而不小心碰着了牠，或是去打牠時，牠才咬人。被蛇咬了之後，一般的症狀是傷口有顯明的牙

痕一對，傷處發生劇痛，浮腫，組織壞死，呈暗紫色，續發急性淋巴管炎或蜂窩炎，全身發熱，感覺遲鈍，並有嘔吐下痢、神智昏迷、譫語、呼吸中樞麻痺、或心臟麻痺等現象，最後致死。

被咬後千萬要鎮靜

毒蛇咬後，毒發很快，因此要趕快醫治。但最重要的，是要保持鎮靜，不可緊張，切勿要奔跑，因為這樣會促使血液循環迅速，毒液很快地蔓延全身，只有加速死亡。被咬後，應立刻將被咬部的上方用布帶緊縛，阻止血流，以免蛇毒攻心。再用消毒過的銳利小刀切開傷口，壓擠出毒液；或用口吸出毒液，但必須口內無傷

處才行。然後用1%過錳酸鉀溶液洗淨傷口，並且立刻送入醫院，請醫生注射蛇毒血清。

注射毒蛇血清

注射血清，必須在被咬後二小時內。並且因為各種毒蛇的毒性不同，所注射的血清種類也不同。最好能認識咬的是什麼蛇，或將蛇打死，拿去給醫生看，知道了蛇的種類，就可對症注射，救得性命。

這裏附帶說一個真實故事。本省光復初年，臺北一個公共浴室中，一位先生洗好了澡，從浴池中出來，不知那裏來一條蛇，一口就咬在他的小腿上，隨即暈了過去，幸好浴室中人多，立刻把蛇打死，並運

人帶蛇一齊送入醫院。醫生看到蛇以後，立刻為他注射血清，後來這個人就被救活了。事後醫生說：如果沒有這條蛇，他就沒法救治了。

不如事前預防好

被毒蛇咬了之後，再來急救，總嫌太晚了，所以最好還是安為預防。預防的方法，是不要到叢林或野草叢生的地方去，如必須去這些地方工作，最好穿着長統橡皮靴子，邊走邊用手杖或木棍敲打，並且最好有人同行。住宅四周的雜草和殘石，一齊要除盡，排水溝加設鐵絲網，以防毒蛇躲藏，並且撒佈石灰，也可防毒蛇侵犯。

燻鷄和葱油鷄

燻鷄 嫩鷄一只，約斤半重；殺好後，拔毛洗淨，內臟留待另用。將鷄倒掛在通風處，滴乾水份；或用乾布擦去水份。再用鹽內外擦透全身，這樣，煮時就不會裂皮。擦鹽後經半小時，再用水煮。

另備清水，約能浸沒鷄身為度，水中加入適量的酒花柳及鹽，等水煮開，將鷄放入水中，煮十分至十五分鐘，用筷子選肉厚處插入，如覺容易插入，就是鷄已煮熟，如煮得過時，就要失去鮮味。將鷄起鍋待涼（如此時切開，就成為白切鷄）。

再將炒茶鍋底放入紙二層，紙上放入紅糖半斤，上面再放入竹蒸架，蓋緊鍋蓋，將鍋放在爐火上，等紅糖燒焦起烟時，將鷄整個放在竹蒸架上燻；一邊燻過後再翻轉燻另一面。等

到全身燻成金黃色，切成塊狀，裝入盆中，加入香菜，便成色香味美的燻鷄了。

燻鍋底放紙，是為了防止紅糖會使鍋底燒成焦黑，不易洗淨。所以最好用破舊的鍋子來燻。這方法也可用來燻鴨。

葱油鷄

嫩鷄一只，先同上法煮成白切鷄，切塊裝盆。另切蔥絲、薑絲、加上適量的鹽。將花生油約三茶匙燒滾，倒在蔥絲、薑絲上，拌勻後，再倒在鷄塊上，就成了葱油鷄了。



再輜