

星期時才給全蠟。像發生這種乳房炎，請獸醫注射抗生素藥物，如盤尼西林等有效果。(李登元)

蔗渣培養西洋菇

須經過良好發酵



問：利用蔗廠副產品蔗渣製造西洋菇嗎？若可以，請問：

或和稻草混合製造好。

(一) 化學肥料之配合指數如何。

(二) 調製方法和製造時應注意事項。

(三) 過去有沒有試驗過，成績如何。

(四) 蔗渣是可以培養西洋菇，但須經過良好的發酵。

答：蔗渣是可以培養西洋菇，但須經過良好的發酵。

(一) 用蔗渣製造時須加用化學肥料。


(二) 化學肥料之用量，一百五十磅斤蔗渣，需加硫酸四磅，尿素一公斤，過磷酸石灰，四五至六磅，炭酸鈣四至六磅。

(三) 調製方法和稻草作法相同。

(四) 農試所和鳳梨公司都有試驗，成績到目前不及稻草好。(胡開仁)

尿素用於柑桔

施入土壤較佳



問：(一) 柑桔用尿素撒佈葉面，同時防治病蟲害，混合農藥有機磷劑或氯化壓劑噴射，驅除害蟲類或殺菌劑防治病蟲，是否會影響農藥減少效力。

(二) 柑桔落花後，幼果時期驅除硬殼介殼蟲類，等待樹株高大，用巴拉松噴射恐噴藥噴落人體極不安全，而用機械油(夏油)有幼果多少藥害落果之憂，除上記二種藥類外，有效的抵毒性農藥，請指教用馬拉松無顯著效果。

以上各位農友的問題，已送請專家解答，請等候本社的答。

(三) 宜蘭地區栽植桶柑為大部分，施肥分春夏秋冬三季，但施肥加用化學氮素肥料施肥，免影響採收時間(果着色(顏色)延遲成熟關係，柑桔發育增大，秋肥三要素並顯樹株健康，柑桔發育增大，秋肥三要素成份，最佳配合比率。(礁溪鄉黃文進)

答：(一) 本省目前生產之尿素，用於柑桔時，以施入土壤較為安全。葉面噴佈之尿素必須含縮尿成分低，且稀釋濃度適合才不致發生藥害。尿素與有機磷劑或氯化壓劑混合，藥效不會減低。

(二) 防治介殼蟲類，應在冬季一月至二月間，以高級夏油七六倍加用五E馬拉松八〇〇倍噴射之。在春夏季連噴噴射，馬拉松可同時防治蚜蟲等。

(三) 秋肥施用時期最遲為十一月，三要素以等量配合最好。施肥量不過多時，不致影響成熟。秋肥施用量以佔全年總量之百分之二十為原則。(陸之琳)

大生22·大生78 適用範圍甚廣

問：大生二十二與大生七十八，其特性有何不同？其使用方法和使用範圍又如何？(屏東縣新埤鄉曾增雄)

答：(一) 大生七十八即 Dichane N-78 又稱 Zined 為殺菌劑，其適用範圍甚廣，可用於果樹，蔬菜之各種炎菌性病害，尤其用於蔬菜方面為優，足以壓例波爾多液及石灰硫黃合劑使用木藥濃度四百倍。

(二) 大生二十二即 Dichane M-22 為殺菌劑，其適用範圍也同前，據筆者就稻熱病方面之室內落劑試驗所知，M-22 似乎較 N-78 效力為強，使用濃度四百倍。(朱啟魯)

讀者服務部小啓

張福乾 楊 甦 彭欽洲 林啓敏
陳盛麒 許正男 謝英山 梁繼熾
黃朝帶 王劍敏 林去盛 何岩友

尿素

肥效等於硫酸銨 2 倍

中性連續使用 保證無害

其他化學肥料

氮化鈣 過磷酸鈣 硝酸銨鈣 化成氣磷

成份保證肥效宏大

臺灣肥料股份有限公司

臺北市衡陽路九十一號 電話：二五六四一四

<p>「沙發美星」</p> <p>注射液 33 1/4%</p> <p>'SULPHAMEZATHINE' 33 1/4%</p> <p>專治禽畜之腸炎肺炎，球蟲病及各種細菌性疾病</p> <p>• 功效可靠迅速 • • 使用簡便安全 •</p>	<p>「芬樂維斯」</p> <p>'PHENOVIS'</p> <p>防治禽畜之蛔蟲胃蟲盲腸蟲及各種寄生蟲性腸胃炎</p> <p>• 治療預防均有效 •</p>
<p>「美尼」</p> <p>'MINEL'</p> <p>防治牛羊之蛔蟲及肝蛭蟲最有效</p>	<p></p> <p>英國卜內門公司各種獸醫藥品</p> <p>• 一經採用 • • 保證滿意 •</p> <p>說明書備索</p>
<p>現貨總經銷</p> <p>永生西藥行</p> <p>臺北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六</p>	