

！病膚皮諸意注天熱



宣 欽 濟

每年五至十月，氣溫增高地面潮濕，最容易發生豬皮膚病，希望各位農友注意預防，已發生的趕緊治療。

在本省常見的豬皮膚病，有紅疹、濕疹、毒麻疹、膿疱性皮炎、傳染性膿疱性皮炎、疥癬、疥癬、毛囊蟲症、疥虱等多種，其中以濕疹及疥癬病最多。

濕疹

病因 豬舍內光線不足，潮濕污穢，豬體不潔，營養不足，慢性下痢，蛔蟲症，軟骨病（佝僂病），草草夾有刺激物，皮膚受傷等，都會引起本病。

症狀 經常濕潤不潔的皮膚，最容易發生。患部發癢，患豬常在舍壁或飼槽摩擦身體，擦傷皮毛。傷部變紅或滲出漿液，有時出血形成痂皮，生皸如象皮。

預防 時常保持豬舍豬體清潔乾燥，供給

營養飼料、青料，並勵行日光浴等。

治療 改善飼養管理，用維生素B₂二立方公分，B₆一立方公分，柏那二立方公分，磺胺劑五立方公分，二十%葡萄糖二十立方公分，混合注射三至四頭病豬，每頭仔豬七至八立方公分。或行氯化鈣鹼脈注射亦可。輕症二至三日全癒，重症須注射一星期以上。

在一胎中發現一頭病豬時，用上述藥品混合注射全部仔豬二至三日，可以避免傳染蔓延。急性濕疹塗擦亞鉛華軟膏，硼酸軟膏，每日一至二次。慢性者用克列林二〇、甘油一〇、水七〇塗抹患部，或用木參兒五，鉀肥五二五，凡士林二五，混合塗抹，每日一次，連用三至四日。

塗藥前應用熱水洗滌豬體，藥效較好，但須併用注射劑以促進治療效果。

毒麻疹

病因 因食物中毒（如繼續給飼腐敗甘藷或酒粕等），突然遭受強烈陽光照射，或蚊子刺螫而引起。發育良好的仔豬較易發生。

症狀 突然在腹部、內股部、頸部、背部等發生豆粒大小或指頭大小的斑疹，發痒，體溫上昇，食慾減退，便秘或下痢。

治療 即時灌腸，灌服緩瀉劑。注射氯化鈣二〇立方公分及維生素B₆。塗抹藥用硼酸鈉一〇，甘油五〇，水一〇。飼料中混合人工鹽三〇公分，給飼一至二次。本症經治療後恢復迅速，並不嚴重。


二種皮炎

病因 傳染性膿疱性皮炎和膿疱性皮炎，是因細菌侵入體內或蚊子咬傷而發生。幼豬皮膚柔軟較易染患。傳染力強，死亡率也高。發生感染時期在五月至十月中。

症狀 在仔豬鼻子、嘴邊、腹部、內股部等柔軟部位較易發生。最先發現豆類大小紅疹數個，數日後就包漿液性滲出物的膿疱，漸次變黃色膿頂面黑點。幾日後變成黑褐色痂

火車跌馬真厲害 害人死傷不應該


林辰有文 小 顧圖



，具工的通交日今
，利便在實路鐵拾貨運
。市與相兩客通。市與村鄉通



，護保妥家大路鐵
，顧照來友共農路鐵
。苦難又便不在實



，兒子教安着母父
，意注安險危路鐵無千
。戲遊童(可不)通萬千
。雖(不)快走來若車火

皮，遍及全身。

病猪生氣消沉，食慾減退，步伐不確，眼臉及關節腫脹，發熱(攝氏四〇至四一·五度)看起來很像猪丹毒。頭皮乾燥時體溫下降，發痒。病重衰弱時可能併發敗血症而死亡。

預防 患母猪的乳房，為傳染病源，所以應早期發現病源，即時治療，以免傳染仔猪。生產後應即用三%來蘇液消毒猪舍和母猪乳房，或撒佈DDT防止蚊子侵入加害。

治療 膿疱性皮膚炎發疹初期，應用碘酒塗抹，或用二%來蘇液洗滌豬體，塗布克列林藥膏(一日一次)。重症用生理食鹽水洗滌，並除去痂皮，再用水質配尼西林二十萬單位和食鹽水二百立方公分溶解後洗滌患部，等乾燥後塗擦配尼西林藥膏，並注射配尼西林三十至六十萬單位及磺胺劑。

疥癬蟲症

病因 因疥癬蟲寄生落皮膚而發生。
症狀 先害生耳朵周圍，漸次延至腿、頸

我徹底防治了甘薯地下害蟲

臺南縣 學甲鄉 王 排

我是臺南縣學甲鄉文化村的農事研究班班員王排，所耕作的土地，都在嘉南大圳的三年輪作區內，因為三年之中只灌溉一期，所以各項作物，尤其是甘薯，每年都受到土壤害蟲的加害，損失很大。

去年，由本鄉農事指導員的指導，在我的耕地設置農復會、糧食局、農林廳、省農會四方合作計劃的土壤害蟲防治示範園一處(二公頃地)，直至今年五月收成甘薯，得到很好的防治效果。就是說，施藥區收穫乾雜交玉米二百九十五公斤(換算價款九百七十三元五角)，及生甘薯三千零七十八公斤(一千八百四十六元八角)，全部未受地下害蟲加害，而對照區一共收到生甘薯三千七百零五公斤，但竟遭蟻象、猿葉蟲、金龜子、甘薯螟蛾等加害達八

、背、腹等部。寄生的皮膚呈紅色，小結節，然後形成魚鱗，呈灰白色，漸變褐色，皮膚乾燥，脫毛肥厚，甚痒，靠牆摩擦，嚴重者出血、化膿、變成潰瘍，或因流出淋巴液形成痂皮逐漸變厚起殼。仔猪往往因而消瘦死亡。

預防 沙掃猪舍，並用三%來蘇液消毒牆壁、飼槽、地面，以防止疥癬蟲之寄生。


治療 用一%尼古丁，硫化鈣軟膏或硫磺軟膏塗擦患部，用〇·二五%BHC乳劑或五%硫化鉀洗刷或噴射(每隔五、六天一次)，至恢復為止。

症狀 寄生多時發痒，被毛脫落，皮膚出血，轉變成濕疹症狀，漸趨貧血。猪舍不潔時容易發生。

治療 用〇·五—一%克列林或來蘇液洗滌，噴射〇·五%DDT或〇·二五%BHC乳劑二至三次就可驅除，但須注意不可給猪甜食DDT或BHC，以免中毒。

·六%，產品價值僅一千七百六十九元。

我的示範園前作物是食用紅甘薯，防治方法是先用耕機鬆整地，用動力噴機噴射四〇%阿特靈可濕粉二百倍液(一噴地一·二五磅)，隨即再用耕機翻地一次，使藥劑混入土內，然後作畦種植。施藥區的甜薯，也先用二五%DDT乳劑一百倍液浸苗一分鐘，然後種植；甜塊膨大時，又在株邊噴同樣的DDT稀釋液一次。對照區全部不施藥，其他管理相同。



友農排王

猪 虱

、背、腹等部。寄生的皮膚呈紅色，小結節，然後形成魚鱗，呈灰白色，漸變褐色，皮膚乾燥，脫毛肥厚，甚痒，靠牆摩擦，嚴重者出血、化膿、變成潰瘍，或因流出淋巴液形成痂皮逐漸變厚起殼。仔猪往往因而消瘦死亡。

疥癬蟲症

病因 因疥癬蟲寄生落皮膚而發生。
症狀 先害生耳朵周圍，漸次延至腿、頸

我徹底防治了甘薯地下害蟲


臺南縣 學甲鄉 王 排

我是臺南縣學甲鄉文化村的農事研究班班員王排，所耕作的土地，都在嘉南大圳的三年輪作區內，因為三年之中只灌溉一期，所以各項作物，尤其是甘薯，每年都受到土壤害蟲的加害，損失很大。


去年，由本鄉農事指導員的指導，在我的耕地設置農復會、糧食局、農林廳、省農會四方合作計劃的土壤害蟲防治示範園一處(二公頃地)，直至今年五月收成甘薯，得到很好的防治效果。就是說，施藥區收穫乾雜交玉米二百九十五公斤(換算價款九百七十三元五角)，及生甘薯三千零七十八公斤(一千八百四十六元八角)，全部未受地下害蟲加害，而對照區一共收到生甘薯三千七百零五公斤，但竟遭蟻象、猿葉蟲、金龜子、甘薯螟蛾等加害達八



友農排王



，乘乳直(于孩)仔團示河
，排路項石運鐵
，害屬真(執出)馬殊
。該應不傷死人害



，非正真仔團示河
，乘運行學政日一
，來遊，礙阻受路鐵
。知長站告報緊趕



，頭石搬工派長站
，走搬來項石整理
，到走就久不車火
。賢標河(掛稱)哩呵家大