



購置農藥，請認明拜耳廠商標

敬當事人西德商拜耳廠股份有限公司出品農藥殺蟲劑富粒多FOLIDOL-E605又西樂生CERESAN又地特松DIPTEREX均經向經濟部中央標準局登記有案倘有他人倣冒偽造上開商標或明知為倣冒之貨物而販賣或意圖販賣者刑法有懲處專條敬當事人必予嚴究特代為登報警告切勿嘗試免蹈法網又倘有顧客向拜耳廠購得有關原料而未經向拜耳廠訂約授權使用上開商標者亦不得將該商標使用於其製品否則仍屬倣冒商標又上開商標貨品之臺灣代理商為臺北市博愛路九十八號中德貿易有限公司用戶賜顧請逕向洽購庶不致誤特此啟事至請公鑒

### 蔡六乘律師代表西德拜耳廠警告切勿倣冒農藥富粒多暨西樂生等商標啓事

蔡六乘律師事務所

臺北市廈門街九九巷三三號  
電話：二四五四九

### 分別挿立支柱 防止植株倒伏

將第一花叢開花完的苗株，連同塑膠布筒搬到本園，一株一株放在栽植穴內，然後拔取木片或竹片，除去塑膠布筒後培土。

栽植深度不可過深，定植後須立支柱，並紮束以避免倒伏。  
支柱須用新的竹子，或經過消毒的竹子才好，不然也會傳染青枯病。

追肥時應儘量避免切斷根部。

病蟲害的管理，和一般栽培相同，但應縮短每次噴射的間隔日數。例

如「大生」宜每隔七天噴射一次。

採收期應比普通提早三至四天，以免引起放射狀裂果。

但在提早採收時，果實顏色不好，應放在室內（較冷的地方）催色，至桃色期才出售。

應用上述的各種技術，可以在七

月下旬開始播種育苗，在八月下旬至十月間採得番茄果實，賣得較好的價錢。如果你過去沒有經驗，請先做一千株的小規模試驗，成功後再較大規模的栽培。

註：「番茄多旺」的用法，請參看本刊第九卷第十四期「甘藍番


茄花菜的夏季栽培」和第十一卷第十七期「促進早期番茄著果的技術」二文。

分公五·八二

不10公分

木片或竹片  
不10公分

法做的筒布膠塑：三圈



驟步的植定：四圖