

# 預防

# 農藥

# 中毒

# 的知

# 識

懷 維 洪

目前所用的農藥，有許多是對人畜有毒的，要避免中毒，最好先明瞭每一種農藥毒性的  
大小，和中毒的發生。有了這些知識，再去採  
取預防的措施，自然會更爲有效。

農藥的種類很多，可是按照毒性的不同，可分爲下列的四個大類：

(一)最毒 屬於下列任何一種的，都是「最毒」的農藥：

①對鼠一  
次口服的「半數致死量」，以每公斤鼠的體重計算，在〇.〇五公分或以下，或者說，以一公分的百分之五或以下的藥量，即可殺死一公斤的鼠的體重。例如用十隻鼠供試驗，各按其每公斤體重以相當量的純淨藥劑，結果有五隻死亡，這個藥量便叫做「該藥的口服「半數致死量」。鼠的體重不到一公斤，則按各鼠的個別體重比例減少藥量。

②對鼠一小時內經呼吸器官入體的「半數致死量」以每一千公升的空氣計算，含藥量在〇.二公升或以下。

③對免廿四小時內經皮膚浸透入體的「半數致死量」，以每公斤免體重計算，連續接觸在去毛的免皮上的藥量在〇.二公分或以下。

本省所用農藥中，屬於「最毒」類者有「弗拉倒」、「巴拉松」、「富賜靈」、「安特靈」、「固殺松」、「依必安」、「滴滴微皮」許多有

機水銀劑等。使用這類農藥時，須特別小心，偶一不慎，很容易引起中毒，中毒嚴重而未及時救治，能致人畜於死。  
美國的農藥法律規定，在這類藥劑的包裝標貼上，須有下面四種說明：

(1)在顯明的地方印有「體骨」標誌，及紅色「毒物」字樣。

(2)解毒方法說明(文中應包括「立刻去看醫生」)。

(3)警告說明(例如如何經皮膚、經口或經呼吸器官引起中毒等)。

(4)如何減免中毒或傷害等危險的方法。

(二)有毒 毒性在上述「最毒」者的十分之一的，都是「有毒」農藥。本省常用農藥大多數屬於這一類，例如：「阿特靈」、「地特靈」、「飛佈達」、「靈丹」、「蟲必死」、「米賜多愛」、「魚藤精」、「多穗」、「阿蘇仁」、「大利農」、「大滅速」、「蠅敵死」、「益加津」、「DDT」、「溴化甲烷」等。

使用這類農藥，仍須小心，千萬不要以爲自己已有經驗，減少戒心而草率從事，如使用不慎中毒，而未及時救治，仍有死亡的危險。美國法律規定，在此類農藥的包裝標貼上，須有下面二種說明：

(1)相當於「最毒」類農藥所需的警告說明，但無需「體骨」、「毒物」字樣，並可免印解毒方法(實際上

一致養雞·豬·鴨的各農家的好消息

## 防治貴家禽畜疾病、把牠們 餵肥養大、增產優良的蛋·肉 這就是增加貴家收入唯一的近路!

費用極小，用法簡便——ロメジンソーダ與ベキシン只要溶於禽畜的飲料水或混入飼料中就可達成目的。請立刻試用。

最新萬畜驅虫藥

預防/治療，雞病的特效藥

動物用

動物用



禽畜也和人一般，體內若有蛔虫寄生，決不能肥大。請把ベキシン每月一次定期的給貴家禽畜吃，看看牠們一天比一天的肥大。

(包裝) 30公分, 100公分, 500公分

對家雞感染的一切疾病有顯著優秀的功效。雞在雞時尤易染病，這時期給與ロメジンソーダ，預防的效果更大

(包裝) 50公分, 100公分, 500公分



製造商

全島有名藥店發售