


或有其他方法請賜示指教。(雲林縣斗六鎮游松泉)

**【答】**：這種狗毛瀝存草是，因土地瘠薄所致，尤其缺乏有機質肥料時的確發生很多，所以照我過去的經驗施用土素(良質的)甲當二〇、〇〇〇磅斤一次就減少，連續施用四次即能減少，如果堆肥不足時，儘量堆肥堆肥亦可代替。施用二四-D殺草劑效果只限表面，決不會完全，其他殺草劑亦同。(余慶東)



平地植梨 仍可結果

**【問】**：我種有三倍多株梨樹，(種類)分為「橫山大梨」、「香水梨」等，現長的非常茂盛約六英尺高，據聞息傳言此類梨樹種於平地不會結果，我亦不知真假，來函請問各位專家賜予指教，是否有何改善的辦法，或者用些什麼肥料能使後來結果，以免後患。(臺北縣石牌)

**【答】**：(一)橫山梨，香水梨，在平地仍可結果，惟一般在平地因水份充足，日照時間長之故，若加肥。整枝等管理欠妥後，即使易過旺，不致結果。

肥料種類，分量及施肥時期如下：

|       |      |      |      |
|-------|------|------|------|
| 肥料種類  | 三年生  | 六年生  | 十年生  |
| 大豆餅   | 壹〇〇克 | 二〇〇克 | 三〇〇克 |
| 過磷酸石灰 | 三〇   | 四〇   | 五〇   |
| 骨粉    | 三〇   | 四〇   | 五〇   |
| 硫酸鉀   | 三〇   | 四〇   | 五〇   |
| 硫酸銨   | 三〇   | 四〇   | 五〇   |
| 堆肥    | 二六三〇 | 三六三〇 | 四六三〇 |

第一次在十一月下旬，將堆肥全部，大豆餅三分之二，其他二分之一。

第二次在十月下旬，將殘渣全部施用。

二、梨樹整枝方法，請參照本刊第十一卷第廿二期，第十三頁，梨樹怎樣整枝？(翁仁祿)

胡瓜栽培 採用直播

**【問】**：費刊十一卷十期十四頁「加工用胡瓜的栽培技術」一文中報導具有加工用特性而適於本省風土之品種計有：「立秋」、「四葉」、「山東四葉」和「近成四葉」四種，請問：(一)「山東四葉」和「近成四葉」的種籽何處有買？價多少？(二)每坪地播種多少粒？需否作高畦？行距株距多少？(三)播種時期？(四)拌種消毒用之「賜保根」或「賜斯普龍」因用錢不多，何處可以分售？(五)一分地收量有多少？以上各點請賜示！(基隆市莫尚仁)

**【答】**：(一)「山東四葉」和「近成四葉」種子可向臺北市南京西路四〇號廣益企業股份有限公司洽購，價錢不詳。


(二)每穴播三—四粒每坪地需要二十粒左右種子，作一五—二十公分的高畦為宜，畦寬一·五公尺(栽種二〇)株距〇·四五—〇·五公尺。

(三)播種期為四至五月，和九至十月宜採用直播並須經常澆水。

(四)種子消毒用之「賜斯普龍」可向員林鎮民生路二七四號興農種子行洽購。

(五)若生育順利一分地可收三千公斤左右，普通作二千四百公斤左右。

新植柑桔園中 可兼作馬鈴薯



**【問】**：「新植柑園，是否可間作馬鈴薯。」(苗栗縣三灣鄉李祺)

**【答】**：(一)馬鈴薯雖然不太選擇土性，惟在生長上，好砂質壤土，土中含有少量有機質，能够增加收量。新開墾的山坡，諒含多量有機質，山坡地排水良好，兼作保持水土。馬鈴薯能够間作。

(二)馬鈴薯在日間營同化作用，製造澱粉等物質後貯藏在地中的根莖，才形成新的馬鈴薯，因此須要光線照射良好，若樹蔭太大，會減低同化作用，減少收量。(陳培昌)

# 大肥啾

飼料補助礦質他命維綜合素抗

每包35元

促進產卵  
預防疾病

驅虫良藥

每盒6元

益源製藥所

台北市羅斯福路三段二七二號

# 中日牌

## 養雞完全飼料

### 中日牌養雞完全飼料 是

本省首創民營最完善之飼料公司出品，品質精良、營養豐富、無論何種雞禽，經常使用均有滿意之效果。

初雛用

蛋雞用

中雛用

種雞用

大雛用

肉雞用

六種

中日飼料股份有限公司

臺北市信陽街二三號 電話三二五五一號 三〇六三四號