

目前經試驗，有兩種藥劑防治「蛭蟥」最有效，一是瑞士山德士公司出品的「蛭立死」，是利用一種毒劑「複聚乙醯」，加入誘引劑製成的條塊狀毒餌誘殺劑，使「蛭蟥」甜食後中毒死亡；另一種是「菸砂」，是菸廠製菸的剩餘菸絲，因「菸砂」含有「菸鹼」，「蛭蟥」接觸「菸砂」後，即受「菸鹼」刺激，分泌大量粘液，漸漸縮小身體而乾死。茲將兩種藥劑的使用方法，說明如下：

(一) 施用量 蛭立死：每十平方公尺施用二十公分，等於每厘地二百公分。菸砂：每十平方公尺施用三百至四百公分，等於每厘地三至四公分。

(二) 施用方法和注意事項

① 播種前或蔬菜生長中先排水。② 將上述兩種藥劑任選一種，稱好用量，用手均勻全面撒施於菜園地上。③ 撒藥最好選擇黃昏時。④ 下雨天「蛭蟥」為害嚴重，應施用「蛭立死」，因為「蛭立死」在雨天仍有誘殺力。⑤ 「菸砂」在雨天施用無效，最好在晴天施用。⑥ 平時防治「蛭蟥」，只施藥一至二次就可以；即第一次施藥後約十天，如再發現有「蛭蟥」，才施第二次。發生特別多的地區，應注意第三次用藥。⑦ 用「蛭立死」或「菸砂」防治「蛭蟥」，都有九〇%以上的效力。⑧ 「蛭立死」和「菸砂」，也可以用來防治蝸牛（露螺），但不必全面撒藥，只在菜園四週，尤其是蝸牛最易侵入的地方，撒施一行約一尺寬就可以。⑨ 平時注意菜園排水，也可以減少為害。⑩ 每季蔬菜採收後，去除枯爛葉和田間及附近雜草，則可減少「蛭蟥」潛伏。⑪ 每季蔬菜採收後，翻耕土壤曝曬，使土壤經過一段乾燥期，也可晒死很多「蛭蟥」和蟲卵。

▲贈送節瓜種子▼

鳳山熱帶園藝試驗所採種，綠皮白毛節瓜種子五千份，每份五十粒，免費贈送本刊讀者，供試作或採種栽培之用，有興趣的，請按照下列次序來信索取：① 準備紙質較厚的信封，寫好本人的姓名和住址，並貼郵票八角。② 寫好本人姓名住址並貼好郵票的信封，再裝在另外一個信封裡。③ 封好貼郵票後，寄「臺北市中山北路二段四三號豐年社」。信封正面註明「節瓜」二字。先到先送，送完為止，不再覆信。



形情的害被巨萬

「英國植物保護有限公司」出品

總代理：英商卜內門洋碱股份有限公司

福施芬 50號殺蟲劑

包裝 250cc 500cc 1000cc

「福施芬」50號防治蟲表列於下(用量以清水每百公斤計算)



作物	蟲 害	用 量	作物	蟲 害	用 量
水稻	二化螟蟲 三化螟蟲 稻飛虱 稻包蟲 浮塵子、其他蟲	50cc	煙草	青蚜蟲	20cc
			香蕉	粉介殼蟲 紅蜘蛛 蚜蟲	50cc 19cc 30cc
柑橘	硬殼軟殼 介殼蟲 綿蚜蟲粉蚜 小紅蜘蛛	80cc— 160cc 30cc 15cc	蕃茄	線蟲	80cc
	潛葉蟲、蚜蟲 青蟲	30cc	蔬菜	野蟲、綿蚜蟲 鋸蜂、食心蟲	10cc
茶梅	紅蜘蛛 捲葉蟲、介殼蟲	15cc 30cc	生果	紅蜘蛛 介殼蟲	15cc 30cc
	錦蚜蟲 蚋馬、粉介殼蟲	50cc 30cc	菊花	線蟲	50cc

臺灣總經銷處
元山貿易有限公司

臺南市復興路十巷四二號
郵政信箱南市郵政一六九號 TEL. 5775