

水使之濕透。

(一) 濕度普通調成後用手緊握木屑，在指間有少許水滲出而不滴落下來為適度。

(二) 菌絲發育一半不再繼續發育下去，原因是培養基(木屑)殺菌不夠，或接種時有雜菌混入，以致限制已發育之菌絲生長。(胡蘭仁)

B·H·C

不宜混合石灰使用



【問】：(一) B H C 可以與石灰混合為柑桔樹之消毒用否，若能混合之比率如何。

(二) 石灰窒素(黑肥)，可否與石灰混合用做肥料用，或消毒用，若能得混合，其配合比率如何。(雲林縣二崙鄉油車村二八號廖學輝)

【答】：(一) B H C 與石灰混合時，會減損 B H C 藥效，不可以與石灰、氮氣化鈣等混合。

(二) 氮氣化鈣(黑肥)可以和石灰混合來使用，混合比率，要看混合後使用結果而定。(吳啓東)

香椿學名有二
生食熟食皆可

【問】：香椿樹其英文學名如何拼寫，據稱該樹葉有香味，在北部能否種植。(臺北)

【答】：香椿樹其英文學名如何拼寫，據稱該樹葉有香味，在北部能否種植。(臺北)

王士琪

【答】：香椿的學名有二：

① Cedrela sinensis

② Toona sinensis

香椿之英文名亦有二：

① Chinese Toon

② Chinese mahogany

葉有香味，可作藥茶，生食熟食均可。在臺灣北部可栽植，有霜的地方亦可栽。(呂福和)

番茄多旺濃度

氣溫高低有別

【問】：(一)「番茄多旺」處理番茄花房，一分地用 100cc 裝的「番茄多旺」幾瓶。

(二) 泡藥的倍液是如何泡法。(雲林縣相鄉程文雄)

【答】：(一) 番茄多旺一瓶(100cc)可以處理二五〇〇株左右，一分地準備二瓶就够。

(二) 氣溫較高時，用一〇〇倍(一二〇倍)，氣溫較低時用八〇倍，普通用一〇〇倍，因為倍數少的關係用內割法(ウチワリ法)稀釋，即一cc 番茄多旺，與清水九九cc 混合泡成一〇〇cc 為宜。(王進生)

讀者服務部小啓

黃定宜 柳振發 連進興 江永統
李清 黃啓漳 賴俊逸 涂成龍
陳松

以上各位農友的問題，已送請專家解答，請等候本社的答覆。

香港輸入

- ◎長岡一號甘藍
- 一、正雲南原種大頭菜子
- 二、結頭菜葉青皮大粒種大頭菜子
- 三、島產發角正種大頭菜子
- 四、島產四川榨菜子
- 五、島產雪理紅子
- 六、金門結頭菜子
- 七、美國 811 胡蘿蔔子

八、美國球型洋蔥子

九、青皮大粒種大頭菜子幾年來皆係敝行獨家售出故對於品種及右記各種絕對負責保證。條件可由顧客要求皆可從命。

其他各種蔬菜種子農藥等價目表函索即寄
臺北市通化街一段一四九號

新合成種子行

電話：四三七八七號
臺灣劉檢儲金第五〇二號

好消息!! 雞白痢特效新葯出現了!!

英商卜內門公司榮譽出品



‘福利來’

防治雞白痢

驅傷寒及其他家禽疾病特效新葯



用法
治療用配：合飼料
一、二倍
預附用：配合飼料
四、八倍
供飼餵



總代理：英商卜內門有限公司
臺北市中正路一八〇〇號 電話：二六六九〇
經銷處：永生西藥行
臺北市中山北路一段一二四號 電話：四二四七六

永先農葯 TRADE MARK 信用最好

省政府檢驗合格農葯
核發登記證 007 025 026 號

巴拉松 乳劑 47%
P-M 乳劑 50%
馬拉松 乳劑 50%

進口外國農葯 兼利生、劑殺
大生、病用、殺
箱熱、病用、殺
西藥生、展着

進口優良農葯“好殺松 50”鋁瓶裝

永先農化工廠
臺中市成功路 276 號 電話 4661 號