

發白，肝臟部份有壓痛等等，最後併發其他疾病，終於變成廢畜被淘汰。

檢查糞便診斷

要想依據症狀診斷本病，比較困難；通常必需檢查糞便證明蟲卵，或行皮內反應檢查。但是蟲卵在發病初期尚不能檢出，相當時間後有覆檢之必要。


特效藥劑三種

治療本病，可用「六氯乙烷」，但有副作用。「四氯化氫乙烷」(武田製藥，(ヘラック)及「二苯甲烷」製劑(ビザオルG11)等有很好的驅蟲效果，副作用較輕。

這些藥劑，都必需在獸醫師的指導下小心使用，方能不至於中毒。

撲滅中間寄主

本病的預防方法有下列數項，但以撲滅中間寄主最為有效：
一、患畜應即時驅蟲，防止散



經途染病的蟲卵肝

佈蟲卵。

二、糞便之處理：蟲卵對乾燥或高溫的抵抗力較弱，糞便應製成堆肥，利用發酵熱防止蟲卵發育或散佈。

三、中間寄主之撲滅：消除田螺，無田螺則無肝蛭。在水田潮濕地帶或湖沼，放養水禽、淡水魚等捕殺田螺，或用硫酸銅三十至五十萬倍溶液殺滅田螺。

四、禁止潮濕地帶之放牧：潮濕地帶的青草，可能附有感染幼蟲，嚴禁喂飼，萬不得已時必經乾燥，以免感染。

△農業小知識▽

△雞糞經晒乾時，對於肥料成分損失極微，要保存雞糞時，須晒乾較好。(吳)

△水田施用石灰的目的，是在中和土壤酸性，使得土壤酸度適合水稻生育，大致每分地可施用三百公斤。(吳)

△硝酸銨鈣、過磷酸鈣等肥料，是供給植物氮磷要素的肥料，至於栽培作物時，能否缺乏鈣質的問題，在本省耕種栽植的水稻蔬菜等，極少可能有缺乏鈣的情形。(吳)

△錫蘭肉桂為一香料藥用植物，在栽培地剝取樹皮作桂皮，由葉中取得油分可作肉桂水。原產地在錫蘭，分佈區域之海拔高度九百至二千公尺。(路)

◁子種瓜節送贈▷

鳳山熱帶園藝試驗所採種，綠皮白毛節瓜種子五千份，每份五十粒，免費贈送本刊讀者，供試作或採種栽培之用，有興趣者，請按照下列次序來信索取：①準備紙質較厚的信封，寫好本人的姓名和住址，並貼郵票八角。②寫好本人姓名住址並貼好郵票的信封，再裝在另外一個信封裡。③封好貼郵票後，寄「臺北市中山北路二段四三號豐年社」。信封正面註明「節瓜」二字。先到先送，送完為止，不再覆信。



，意注要物通拜
(要不)治愛無物食壞局
，醫緊要亂霍着染
。時了誤信通無



，代時的行流亂霍
(要不)治愛無物食壞局
(要不)治愛無物食壞局
(要不)治愛無物食壞局



，緊要最生衛天夏
(要不)治愛無物食壞局
(要不)治愛無物食壞局
(要不)治愛無物食壞局