



有機磷
劑中毒
的急救
方法

如已發現警告性的中毒症狀（參閱上期），同時患者尚能吞嚥東西，可速服「阿脫品」藥片二片（每片中含量0.6mg，這種藥片可商請醫生後向藥房購得，以備急救之用），或立刻就醫注射「阿脫品」劑。注意：勿用「嗎啡」及「阿得那林」類（Adrenalin）劑。如患者尚無警告性的中毒症狀，請勿用「阿脫品」，中毒嚴重者速送醫院，可視情形多服或多注射（據德國衛生實驗室，皮下注射份量一次可達2mg。據美國 Shell 公司

農藥中毒的急救方法

洪維懷

。此外尚有「巴姆」(BAM)解毒劑可用，但此劑僅有針劑，須由醫生注射。

如患者呼吸停止，即行人工呼吸，立刻送請醫生救治，必要時可用氧氣（壓力十五至廿公分水柱）助其呼吸。

此外如服活性炭粉以吸收胃內毒液，或用百分之一的石鹼水微溫湯洗胃，注射葡萄糖或生理食鹽水，排泄或吸收氣管內分泌物等，均可幫助解毒。

(2) 體外中毒 例如不慎誤及或粘着藥液粉末於衣服、皮膚等，除應立刻換去污染衣服並用肥皂水及大量清水洗淨外，須速將患者移離用藥的地方，以免繼續再與藥劑接觸。如濺及眼睛，應立刻用大量清水沖洗至少十分鐘。

解毒及急救方法，同上述體內中毒所載，立刻送請最近處的醫生救治。

患者自中毒起四十八小時以內，必須不斷的細心看護，經救治復元的，仍應小心觀察日後的健康情形，例如測定其血液中的「酯化胆素」是否已完全恢復正常；因為已中過毒而未恢復正常的，對有機磷劑會比中毒以前（指健康時）更容易中毒，所以除非血液中的「酯化胆素」已恢復正常

(2) 體外中毒

(2) 體外中毒 例如不慎濺及或粘着藥液粉末於衣服、皮膚等，除應立刻換去污染衣服並用皂水及大量清水洗淨外，須速將患者移離用藥的地方，以免繼續再與藥劑接觸。如濺及眼睛，應立刻用大量清水沖洗至少十分鐘。

解毒及急救方法，同上述體內中毒所載，立刻送請最近處的醫生救治。

患者自中毒起四十八小時以內，必須不斷的細心看護，經救治復元的，仍應小心觀察日後的健康情形，例如測定其血液中的「酯化胆素」是否已完全恢復正常；因為已中過毒而未恢復正常的，對有機磷劑會比中毒以前（指健康時）更容易中毒，所以除非血液中的「酯化胆素」已恢復正常



稻浮塵子，稻飛虱為害
稻田，逐年增加造成。

看不見的損失!!

甚至減少收成三四成

賽文
SEVIN

浮塵子。飛蠶都是小小的害蟲，喜歡寄棲在稻葉下面陽光直接照射不到的地方產卵、孵化、生長集體繁殖迅速。稻株愈繁茂這些小蟲繁殖愈多，又不易看見，至稻株出穗後它們刺破稻葉生食之澱粉乳汁，因此更加加速繁殖。一般人認為稻株健康無病枯心或白穗就不介意了，直至收割、晒谷、拉米時才發覺稻谷空心或變成碎米，減收三四成時後悔已遲。但從秧田期起就需噴撒福農牌資文的農友，年年豐收，沒有前述減收情形了。因為資文防治浮塵子、飛蠶、稻黑格象之外尚能殺治三化螟蟲至九八%以上（見五十年植保試驗報告第三頁）對於殺治二化螟蟲、捲葉蟲、稻薊馬、蝗蟲等害蟲亦有效力，並抑制可牠的「稻黃萎病」陸續蔓延。雖然有人稱此為「預防」，但是和近日大家正在調劑雀亂一樣，如果有了預防就不致發現調劑亂，一經發現即使短期內撲滅損失已經不小了，所以病蟲害專家時時要提醒「預防強於急治」！我們現在要勸農友們趁早在稻田中噴射福農牌資文五%可濕劑一〇〇倍稀釋液每甲一二〇〇公升或撒佈福農牌資文一、五%粉劑每甲四〇〇公斤，秧田期噴撒一次，拔秧後噴撒一次以資預防，如果以後再有上述害蟲發現時應再噴射一次，那麼豐收可以預下的。結穗時期的水稻，只許用無臭味、低毒性的強力殺蟲劑，使人們可以吃無毒性和惡臭味的米飯。福農牌資文是低毒及無臭味的，請農友們採用以防治害蟲和增加生產確保食出米飯人的健康。

美 孚 農 有 限 公 司
總 經 銷 臺 灣 總 經 銷

總經銷處	臺北市南海山四六號	電話	三一四四九
郵政劃分銷處	臺南市第九三九號	郵政劃分銷處	臺南市第九三九號
可溫性粉劑分銷處	新竹縣新竹市南興里西大路一〇五號	可溫性粉劑分銷處	新竹縣新竹市南興里西大路一〇五號
	臺南才豐藥行		臺南才豐藥行
	高雄縣臺南市車門路一四〇號		高雄縣臺南市車門路一四〇號
	其他區域興農化學工業有限公司		其他區域興農化學工業有限公司
	臺中縣大里鄉內新村		臺中縣大里鄉內新村
分	劃分銷處	亞細亞化學股份有限公司	亞細亞化學股份有限公司
	臺北市武昌街一段七號		臺北市武昌街一段七號