

，應不許再與任何有機磷藥劑接觸。

氯化烴化合物中毒的急救方法

(1) 體內中毒

例如誤食或吸入體內，用手指或箸觸使毒物吐出，或飲服溫鹽水（每一玻璃杯水加鹽一茶匙）再使毒物吐出。患者已失知覺時，不要給以任何食物，立刻去看醫生，首先應儘早用鹽湯洗胃至吐出物無農藥氣味為止，千萬不要用含有油脂的湯水洗胃，或給以含有油脂的東西入口，因為這類農藥的毒質，大多數易溶於油脂類，油脂會加速毒物進入身體內臟。

本類農藥迄今尚無解毒劑可用，下面幾種解救方法，可以幫忙減免中毒的危險性：

- (甲) 神經過敏、食慾減退、身體消瘦為中毒徵兆，應即就醫，為安定中樞神經中毒症候，可服用鎮定劑 Barbiturates，所服份量須足夠以控制痙攣，以後可視情形慢慢減少份量，至無神經過敏症候時停止服用。
- (乙) 服用或注射葡萄糖鈣（可與鎮定劑並用）。
- (丙) 用活性炭粉二份，氧化鎂一份，單寧酸一份的混合劑十五公分，用水服下，以吸收胃內毒質，然後再服嘔吐劑，使毒物吐出。
- (丁) 繼續內服三十公分的硫酸鎂及多量的水，使腸內物質瀉出。
- (戊) 再飲用熱茶靜臥床上。
- (己) 多食鈣質或高價鹹水化合物，可避免肝臟中毒。

(2) 體外中毒 如藥液粘着皮膚、衣服，除立即換去污染衣服，並

用肥皂及大量清水洗淨外，須速離去用藥的地方，以免繼續接觸藥劑。如果藥液濺及眼睛，立即用大量清水沖洗最少十五分鐘，並就醫治療。

救治方法同上。體內中毒所載，立刻去看醫生。

有機水銀劑中毒的急救方法

這類農藥的中毒，祇有直接誤食、吸入體內或間接由手、器具等入口而致。症狀為：腹劇痛、唾液流出、失神、下肢知覺鈍、閉尿、發熱、虛脫等。救治方法如下：

- (1) 用手指或箸觸喉，使毒質吐出，用溫石灰水、牛乳或百分之一石鹼水洗胃，內服硫酸鐵或活性碳粉。
- (2) 多飲蛋白水（蛋白三至四個，加水一公升）與牛乳，飲服稀粟糊或麥粉糊。
- (3) 內服鎮痛劑，飲服濃咖啡、濃茶或興奮劑以避免虛脫。
- (4) 內服稀葡萄糖液，或皮下注射千分之一硫酸阿脫品劑。
- (5) 內服碘化鉀，使水銀物質易於排泄。

神(砒)化學物中毒的急救方法

這類農藥也祇有口服中毒。症狀為：急性胃腸加答兒、腹痛、嘔吐、下痢、頭痛、口眩、痙攣、虛脫等。救治方法如下：

- (1) 用手指或箸觸喉使毒質吐出，用溫石灰水、牛乳或百分之一的石鹼水洗胃，內服砒解毒劑氧化鎂七十五份，水一百份合劑，或骨粉炭。
- (2) 多飲蛋白水及牛乳。

在來種稻熱病特效藥

大好年

特點：

- 一、絕無藥害（據50年度臺中區農業改良場試驗報告）
 - 二、藥效優秀（據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告）
 - 三、提高產量（據50年度臺中區農業改良場試驗報告在無發生病害區使用結果增收7%）
- 注意：避免與安特靈等有機磷素劑混合最好單獨使用



(ダイコーネン錠)

製造元 日本三笠化學工業株式會社

總經理 裕隆商行

臺中市建國路一六七號 電話：四八五五號