



(杯肥施梨鳳製膠塑)

鳳梨施肥的模範例

栽培鳳梨的利益，和施肥是否適當很有關係。在上期「最合理的鳳梨施肥法」一文中，我們曾經討論過鳳梨施肥的一般原則，下面是實際施肥的一個標準。

上期「最合理的鳳梨施肥法」中所述各點，是鳳梨施肥的基本常識，下面根據試驗研究結果，和實際應用的經驗，介紹施肥法一例（左表），以作農友的參考。如果能够切實按照所示的數量、方法和時期去施肥，每公頃四萬株收二回，產量要達到一百噸以上，並不困難；在氣

候和土地條件較好的地方，甚至可以超過一百二十噸。

不過在應用本表時，還要注意下列幾點：

一、如果要在第二年年八月底至九月月上旬施用電石（限於早植發育優良者），七月份肥料應提早，與六月份肥料合併施下，九月份肥料應在施電石後十日施下，十一月份肥料提早在下旬施下。
二、左記是一般用量，實際上，應依照氣候土壤的差異而加以調節。例如葉色在六至十一月中旬由正常的綠色變為黃綠色，應加施尿素，葉色太暗應減施下次的尿素用量。又鉀素含量特別低的土壤

每萬株施用量（公斤）

尿素（含氮四六%）
硫酸鉀（含鉀五〇%）
過磷酸鈣（含磷一六%）

施用部位

期別	日 期	主 作 期 (年第三至年第一)	宿 根 期 (年第四至年第三)
每萬株施用量(公斤)	九月二十——三十日 (種植後三十日)	九月十五——二十五日	八月二十——三十日
	三月一——十日	七月二十五——八月五日	十月二十——三十日
	六月五——十五日	九月十五——二十五日	三月一——十日
	三月一——十日	十一月五——十五日	三月一——十日
	五〇	五〇	四〇
	六六	三三	四〇
	三三	三三	四〇
	三七	二五	六〇
	二五	五〇	四〇
	四七	五〇	四〇
施 用 部 位	分施於株下兩側土中一寸深	葉腋兩側	葉腋兩側(小吸芽施在母株葉腋)
	株下單側土中一寸深	葉腋兩側	葉腋單側
	株間中點土中一寸深	葉腋兩側	葉腋兩側
		葉腋兩側	
		葉腋兩側	
		葉腋兩側	
		葉腋兩側	
		葉腋兩側	
		葉腋兩側	
		葉腋兩側	