



鳳梨施肥的模範例

栽培鳳梨的利益，和施肥是否適當很有關係。在上期「最合理的鳳梨施肥法」一文中，我們曾經討論過鳳梨施肥的一般原則，下面是實際施肥的一個標準。

上期「最合理的鳳梨施肥法」中所述

，以作農友的參考。
如果能够切實按照

所示的數量、方法和時期去施肥，每公頃四萬株收二回，產量要達到一百噸以上，並不困難；在氣

候和土地條件較好的地方，甚至可以超過一百二十噸。

不過在應用本表時，還要注意下列幾點：

一、如果要在第二年年八月底至九月上旬施用電石（限於旱植發育優良者），七月份肥料應提早，與六月份肥料合併施下，九月份肥料應在施電石後十日施下，十一月份肥料提早在下月下旬施下。

二、左記是一般用量，實際上，應依照氣候土壤的差異而加以調節。例如葉色在六至十一月中間由正常的綠色變為黃綠色，應加施尿素，葉色太暗應減施下次的尿素用量。又鉀素含量特別低的土壤

每萬株施用量(公斤)

期別	日	期	每萬株施用量(公斤)	施用部位
主第	九月二十——三十日 (種植後三十日)	五〇	五〇	分施於株下兩側土中一寸深
作至	三月——十日	六六	五〇	株下單側土中一寸深
年一	六月五——十五日	三三	三八	株間中點土中一寸深
第三	七月二十五——八月五日	三三	三七	葉腋兩側
期	九月十五——二十五日	五〇	二五	葉腋兩側
	十一月五——十五日	三二	五〇	葉腋或灌入三〇——四〇倍水
	三月——十日	六六	五〇	中灌入心部
宿第三	八月二十——三十日	四〇	六〇	葉腋兩側(小吸芽施在母株)
根至	十月二十——三十日	四〇	四〇	葉腋單側
第四	三月——十日	五五	四〇	葉腋兩側
期	合	計	一三五	一〇〇
	合	計	三三〇	二五〇
			一四〇	一四〇

增加一半，反之，鉀素含量豐富的土壤，可以減少一半。

三、尿素亦可代替，但用量是，用量的二·三倍。硫酸鉀不宜用氯化鉀代替。

(蘇楠榮)

可樂與加裕 (コロイカル)

家禽、家畜、蚕魚、營養飼料素、強壯保健劑

製造元 白石カルシウム株式會社

強力安雛素（ノキサリン）

鴨之球蟲症治療及預防家禽霍亂（コレラ）之預防鴨之感冒咳嗽治療，豬之赤痢（出血性下痢性）

強力寧禽片
(ヘルミノツク錠)

出品廠 大和化學工業株式會社東京工場

美耐元
(ミネゲン)

理想的綜合強力礦物素、強健多產、激滅廢鷄、促進發育、預防啄毛、防止腳弱、防止軟破卵

製造元名古屋 ミネラル飼料株式會社

日本原裝魚粉蛋白質成分50%，南美洲65%以上

日本魚精、切菜機、鷄糞乾燥機、

臺灣總代理

東盈實業股份有限公司

地址：臺北市廸化街一段42號

電話：
四四
四四
四四
五一