


農業信箱

來信請用明信片
信中免寫寄氣話
書明姓名和住址
信封上註「農問」

家兔配種受孕

約卅天後生產



【問】：我在越南養兔，已經兩年有餘，但下列問題，仍無法解決：

(一) 母兔交配後三十天產子，但總有十之二三到期始知未曾受孕，亦有逾三五天，始生產一兩隻小兔，故交配半月後，撫摩其腹部，亦不易斷定是否受孕，欲及早發覺，以免虛耗飼養工料，應如何處理？

(二) 母兔產子後，竟有自食其子或咬去其手足耳等，原因何在？應用何法防止？

(三) 母兔產子後，有拒不哺乳，直至小兔全部餓死為止，不特初生之母兔如此，即有生育經驗，一向紀錄順利者，亦會不哺乳，待發覺時，即將其小兒移往同期生產之其他母兔哺乳，但小兒受體弱，能挽救者甚少，曾以牛奶喂入人工哺乳，又苦不得適用之小奶嘴，偶多給一點，耳鼻兩孔，均噴出奶液，結果亦不易生存，應用何法補救？(越南黎望)

【答】：(一) 家兔配種受孕後，大部份是三〇天生產，三一天生產者極少，逾期三五天者更少，據我們記載的結果，根本無此現象，至于有無受孕的檢查，對養家兔者，確是一個重要課題，普通交配後十天左右，即可檢出，檢出率總在九五%以上，是要早上尚未吃草前檢查，否則胎兒與宿糞，很容易相混而發生誤差，關於此點，請你多多練習

，以增進你的經驗。

(二) 母兔生產前後要十分安靜，更要有舒適之生產箱，如生產後常有人去看，或用手去摸、捉，可能大部份都會發生母兔自食其子之事，但如果每次生產都有同樣的情形發生，該兔不能留種用，以淘汰為宜。

(三) 母兔在初產時，有極少數者是不哺乳，但至第二胎即正常，如每胎均如此，該母兔仍以淘汰為宜，至用牛乳哺育仔兔，那太費事了，時間上很不經濟，況且一只兔的代價並不很高，何必要如此的麻煩去飼養呢？如將仔兔放到同年齡之另一窩去，或許可救活，但在未開眼前，多數被母兔吃掉，如不小心，而易引起連該母兔自己生產者亦食掉。

(四) 家兔生產力強，如有上述事情發生，可以不必花費較多時間去挽救，以淘汰為宜。(黃立群)

熟帶貯藏種子

設法維持乾燥

【問】：我自留各種種子，裝在水晶瓶中，時常致使發芽不順，有時不發芽，為何原因，日本鐵罐裝與酒精裝，同樣無空氣何以結果迥異，請明示。(彰化縣大村鄉賴榮登)

【答】：(一) 雖將採收之種子經過曬乾後裝入酒瓶內，但其發芽仍然不佳的原因，係為種子乾燥程度不夠(普通蔬菜種須晒至水分含量至一〇%—一%左右)及無裝滿種子所致。前者致使種子貯藏中，仍進行呼吸消耗養分及生霉，而種子活力減低或殆盡，後者致使種子由空隙的空氣中，吸收水分，而進行呼吸消耗種子活力，故用酒瓶貯

經濟部核定甲級農藥工廠



稻熱病

三本 西藥生石灰

殺蟲劑

三本 BHC 粉劑

殺蟲劑

三本 飛佈進粉劑

山本農藥有限公司

臺北市開封街一棧18號
電話：23606

增加產量請用 山本農藥



各種乳劑 應有僅有

尿素

尿素 肥效等於硫酸銨 22 倍
尿素 中性 連續使用 保證無害

—其他化學肥料—

氯化銨 過磷酸鈣 硝酸銨鈣 硫酸銨鈣



成份保證 肥效宏大
台灣肥料股份有限公司
台北市衡陽路九十一號 電話：二五六一—