

元萬收增·果摘蕉香

高田 雄察 縣鄉 爵靜林

高雄縣田寮鄉林爵靜農友，栽培香蕉有二十多年歷史。最近他參加高雄縣農事研究班經驗發表會，發表他怎樣用摘果方法提高香蕉栽培收益的經驗，獲得了全縣第二名的光榮。本文是由鳳山園藝試驗所朱仙和先生筆錄投寄本刊的。

我家栽培香蕉，已有二十餘年的歷史。過去為香蕉買賣，常常和商人發生不愉快的事情；因為所生產香蕉品質不好，很難達到他們理想的標準。在此期間，往往每萬斤香蕉，占有三千多斤不合格品，非降低價格賣給他們不可。後來，對香蕉的摘果特別注意研究，經數年來的經驗，實施摘果栽培，每甲地確能多收一萬元以上的利益。

摘果的標準

應該保留的果房層數，和土質肥分、樹勢強弱等有關，但以季節最為重要：

- ①春季：香蕉樹勢旺盛，養果能力強，假定有十至十二層果手的果房，可摘下二至三層。
- ②夏季：養果能力不如春季，所以假定同一層數的果房，必須摘掉四至五層。
- ③秋季：水災風災多，香蕉樹勢最衰弱，所以應該摘除半數或比半數多一層。

摘果的方法

香蕉樹高，必須訂製一把長柄的割刀（長柄香蕉刀，約二公尺長），以便使用。

當所吐香蕉果房層數分明時，就可開始摘果。

除按照上述標準摘果外，如有畸形果、受傷果，最好也一併摘除。

摘果時，不可一刀就剪掉，夏秋香蕉果軸要留長一點，即應剪的果房上層次層，各留一至二段。其他應該摘果的，就從

果房和果實的橫間，開刀割掉和剪去蕉蕾。

香蕉每季開花結實期間，最多二至三個月，看結實情形，大約每星期巡閱二次，選出摘果對象，進行摘果。

依我的經驗，每公頃約三小時就可巡完，三個月期間，巡閱二十四次，時間只需六十五小時。



友農爵靜林


加水倍数	噴霧器裝滿容量加入所需掛式(8公升)	容量原藥量(14公升)
1,000倍	8cc.	14cc.
1,200倍	7cc.	12cc.
1,500倍	5cc.	9cc.
2,000倍	4cc.	7cc.
2,500倍	3cc.	6cc.
3,000倍	2.5cc.	5cc.
3,500倍	2.2cc.	4cc.

世界農藥最權威西德拜耳廠 (BAYER) 繼富粒多後又出現一種最新最強殺蟲劑也



貨好價保 標商此有

害蟲種餘百四治滅可



巴拉松 (PARATHION)

適用於果樹、水稻螟蟲及一般病蟲害。殺蟲效能廣泛，採用特種原料，成份準確。

總代理 中德貿易有限公司
現貨供應處 元山貿易有限公司
臺北市中正路一八二號
電話：二五八四·三一六
連絡處 臺北 臺南市復興路十巷四二號
電話：五七七五

水稻螟蟲→第一至二化期1500至2000倍水
第二期以後1000倍水
水稻黑椿象→1000—2000倍水
水稻黑尾浮→1000—2000倍水
塵子及飛蟲→2000—2500倍水
水稻負泥蟲→3000倍水
其他作物蟲害→可詢問鄉公所或農會