


曆八月上中旬以「葱青」採收而出售，普通種植後約五十天，就可以採收「葱青」，早期栽培時請多施過磷酸鈣，以促進發根為宜。

(四) 採收「葱青」後可以種植番茄馬娜露西，栽培時每十畝宜用氫氧化鈣四五公斤左右作為基肥消滅土壤為佳（施氫氧化鈣後經過三星期始可種植番茄）。

(五) 番茄馬娜露西可以在農曆七月下旬開始育苗，並在農曆八月中旬俟球葱採收後種植，種植後約六十至六十五天就可開始採收，採收期間約四十至五十天。（王進生）

木耳使用荷爾蒙 尙有待試驗證明



【問】：在木耳生長期中，發生如盒內之蟲類（蟎及另一種類似毛蟲）兩類繁殖力甚強，並均能影響木耳之發育現將左列問題煩請解答之。

(一) 此蟲可否噴曬農田用二十五% DDT？噴後約六天採木耳，該藥對木耳之發育，對吃木耳的人有無影響？或有其他藥品可用？

(二) 請問栽培木耳有何技術？對增進木耳發育有何方法？木耳在生長期中是否也要任何食物促進它，有人說濕快豐收荷爾蒙劑是否適當？（彰記縣竹塘鄉黃炳煙）

【答】：來信附寄木耳青蟲標本，在運送途中已經腐爛，看不清為何害蟲，驅除青蟲最好方法，是將木耳栽培現場及周圍環境打掃清潔，減少青蟲匿藏，施用農藥時，應先知道它是何種害蟲，而後選擇最有效之藥劑，才能達到防治目的。

(一) 栽培木耳的技術有①選擇天陰四陽及通風良好之場地。②採用木耳生長最適之潤葉樹栽培，如榕樹油桐桑及柳樹等。③購買政府審查合格菌種場之木耳菌種。④管理應注意溫度濕度之配合，陽光透射之程度及通風等。

(二) 促進木耳發育荷爾蒙是否有效，需要試驗證明始能大規模應用，目前有很多商人投機取巧，擴大宣傳，望勿信任。（胡開仁）

臺農四號鳳梨 施肥方法相同



【問】：(一) 對於臺農四號鳳梨未知可以施用尿素肥料嗎？

(二) 如若可能者施用淨尿素於株間；或參水施於鳳梨葉面。

(三) 或用其他什麼肥料可以施入。

(四) 第四號鳳梨期間，何時至何時可以施肥。以上請指示嘉義縣中埔劉建英。

【答】：鳳梨可以使用尿素肥料來栽培，其施肥法即尿素與磷肥，鉀肥混合後施於鳳梨株間為妥，臺農四號品種亦同樣。施肥時期在三、四月間施下較好。（吳啓東）

包心白菜易生腐敗病 以避免連作為佳



【問】：包心白菜繼續連作未知可否，連作管理方法並施肥方法病蟲害防治，希望指教。（彰化縣溪州鄉彭明地）

【答】：(一) 包心白菜容易發生腐敗病，一旦發生腐敗病其病菌殘留園場而傳染後作之作物，故宜不連作為原則，雖與其他作物輪作，但宜不與葉菜類、葱、胡荽輪作，避免互相傳染腐敗病，致使無收成。最好與水稻，胡瓜菜豆等輪作為佳。

(二) 若必需要連作，園場宜用一千倍烏斯普龍消毒液播種穴後下種，並在本葉展開後繼續噴射大生七八四〇〇至五〇〇倍。腐敗病菌不但由葉部侵入，並且由根部侵入。

經濟部核定甲級農藥工廠



各種乳劑 應有儘有

稻熱病
三本 西樂生石灰

殺蟲劑
三本 B.H.C. 1.5% 3% 粉劑

殺蟲劑
三本 飛佈達粉劑
可防治地下蟲害

增加產量請用 山本農藥



山本農藥有限公司
臺北市開封街一號18號
電話：2 3 6 0 6

請全省獸醫師養豬養雞業者注意！

豬、雞驅蟲藥之王
阿司卡利肯

(內藥登字第一四六四號)

「適應症」 豬、雞之蛔蟲症、結節蟲症、鞭蟲症
公認
最安全
最有效
最便宜

① 效力強大——殺蟲之力量百分之九十五以上。比任何種驅蟲藥超。成蟲、蟲卵均死滅絕無副作用。

② 用法簡單——投藥前不須絕食，服後不須使用瀉藥洗腸。

③ 價格最廉——豬一頭一元，成雞一隻僅五分代價可獲得數百倍利益。

日本東芝製藥株式會社榮譽出品


臺灣總代理 臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司
臺北市信義路二段一二〇號



，故新鮮的人糞尿，不可使用，避免損害根部減少病菌侵入之機會。肥料須注意三要素配合，宜增加磷酸鈣及鉀分，使它的生育健全，並注意圃場之排水。品種宜採用平塚一號，較抗腐敗病。中耕除草，宜在生育初期行之，一旦開始結球，不可進入圃場，因會損害葉一部，並腳會壓斷細根，增加病害發生之機會。

(三) 種子可用冷水及溫水消毒法來處理，將種子浸於清水六小時後，再浸於五十四度的溫水五分鐘，就可殺滅黑斑病菌。連作時毒菌發生亦多，故噴射大生時與加用馬拉松液驅除蚜蟲。(王進生)

橫貫公路沿線
適合栽植雪梨



【答】：(一) 日本長十郎雪梨(有名雪梨，正花梨)合於本省栽培否，海拔高度需要若干。

(二) 橫山水梨分有早生，中生，晚生未悉那種較佳，及果粒大小如何。海拔高度如何。

(三) 橫山水梨嫁接木需要何種，何處有售，請指教。(宜蘭縣頭城鎮林棟樑)


【答】：(一) 日本種梨，長十郎，適宜於本省北部，海拔一千公尺以上，中部一千三百公尺以上高冷地栽培。目前本省橫斷公路沿線之梨山，思源等地均有長十郎之栽培。梨山福壽山農場並有苗木之出產。

(二) 橫山水梨適於本省中、北部平地及丘陵地帶栽培，有早中晚生之三種，其中中生收量高，品質佳，為最普遍栽培之品種。早中晚生三種之果粒大小比較如下表：

品種名	重量	高	長徑	短徑
橫山早生梨	六六公分	六公分	七公分	七公分
橫山中生梨	六六公分	七公分	七公分	七公分
橫山晚生梨	六六公分	八公分	七公分	七公分

(二) 橫山梨以鳥梨為砧木。售苗處可參閱本刊廣告。(翁仁敏)

施用尿素
可混農藥



【問】：(一) 日製尿素，可否和農藥混合使用噴在包心白菜上。

(二) 尿素對包心白菜之葉面施肥之濃度若干。

(三) 噴射之時間何時最好在上午或下午。(高雄縣路竹鄉王元全)

【答】：尿素，無論日製或省製，均一樣可以和農藥混合使用，噴在白菜上，尿素之稀釋濃度二份為適宜，使用時間最好在上午，包心菜葉上沒有水滴時噴上。(吳啓東)

本省種植棗樹
中南部較相宜

【問】：(一) 適應栽培棗的體質和氣候怎樣？

(二) 棗是否有栽培經濟價值，銷路如何？

(三) 最近有種苗商出售大粒甜棗者，據稱經過改良，品質比較原來好，且果實較大豐產，是否事實？

(四) 據聞棗栽植後一年即可生產，是否事實，如果事實，是否可以和柑桔間作栽培，待柑桔成齡時次除棗樹。(嘉義鄉鹿草鄉林明傳)

【答】：(一) 棗樹，在本省各地均可生長，惟印度為原產之故，本省中、南部一帶較適宜。樹勢旺盛，不擇土壤，稍酸性土壤仍可生長，地勢以排水良好，但不過於乾燥之地為佳。

(二) 棗果，現時因市場供給量少之故，銷路好，價格高(去年之批發價為每公斤四元至六元)。

(三) 近日來彰化縣永靖鄉新高苗圃出售之大棗品種果型大，成量豐富，漿液，甘味略少，具蘋果味。

(四) 栽植一年後，雖可生產，但收量

大肥啾

抗生藥綜合維他命礦質補助飼料



飼料店，農會均售

促進產卵 預防疾病

益源製葯所
台北市羅斯福路三段二七二號



與德國拜耳藥廠
及瑞士嘉基公司
技術合作在臺獨家配製

五豐商標

- 富粒多乳劑
- 巴拉松乳劑
- 馬拉松乳劑
- 馬巴乳劑
- 安巴乳劑
- 大利農乳劑
- 安特靈乳劑
- 克羅末乳劑
- 西樂生石灰
- 蟬螂螞蟻藥

經銷處

- ① 臺北市 迪化街 臺灣農產企業公司 電話 44253
- ② 臺中市 三民路一段175號 信全農藥行 電話 3343
- ③ 員林市 中山路229號 信全農藥行 電話 134
- ④ 雲林斗南鎮 南昌里新興街30號 永豐農資材行 電話 174
- ⑤ 嘉義縣 義竹鄉六柱村201號 豐安藥房 電話 4971
- ⑥ 臺南市 東門路140號 永豐農藥行 電話 4971
- ⑦ 高雄縣 鳳山鎮第二市場內 農友種子行 電話 4971
- ⑧ 高雄縣 竹筒村170號 福源商號 電話 4971
- ⑨ 宜蘭縣 農會及各鄉鎮農會
- ⑩ 花蓮縣 農會及各鄉鎮農會
- ⑪ 桃園縣 農會及各鄉鎮農會
- ⑫ 新竹縣 農會及各鄉鎮農會
- ⑬ 苗栗縣 農會及各鄉鎮農會

五豐化學工業股份有限公司

公司：臺北市中正路1791號二樓 電話：31691
工廠：北基公路七堵草蓋站旁 電話：七堵36號

